BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XVIII
E
43
NAPOLI

XXVIII.

Digitized by Google

ESSAI

SUR

L'HISTOIRE NATURELLE

DES

CORALLINES,

ET D'AUTRES

PRODUCTIONS MARINES

DU MÊME GENRE,

QU'ON TROUVE COMMUNEMENT SUR LES COTES

DE LA

GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE;

AUQUEL ON A JOINT

UNE DESCRIPTION

D'UN

GRAND POLYPE DE MER,

Pris auprès du POLE ARCTIQUE, par des PÊCHEURS de BALEINE, pendant l'Été de 1753.

PAR

JEAN ELLIS,

MEMBRE DE LA SOCIETÉ ROYALE.

TRADUIT DE L'ANGLOIS.

A LA HAYE,

CHEZ PIERRE DE HONDT,

M. DCC. LVI.

Digitized by Google

A

SA MAJESTÉ LA REINE DE SUEDE.

MADAME,

QUELQUE diſtance qu'il y ait de moi juſqu'au Trône où VÔTRE MAJESTÉ a fait monter avec Elle toutes les Vertus & toutes les Graces, on ſait trop que de ce haut faite des Grandeurs Humaines Vous daignez jetter des régards de Protection ſur les Sciences, pour que j'apprehende d'être taxé de temérité en mettant à Vos pieds l'Ouvrage que j'oſe conſacrer à Vôtre Nom.

UNIE à l'Auguſte Monarque, qui vous a donné la main pour faire le bonheur & les délices d'une Nation éclairée, la ſupériorité de Vos Lumières, un goût décidé pour le Beau, & l'amour que vous portez aux Connoiſſances utiles, Vous ont ſi fort élevée au deſſus des frivoles amu-

ſemens d'une oiſiveté faſtueuſe, qu'on eſt ſûr de ne Vous pas déplaire, en Vous invitant à Vous délaſſer au Spectacle inſtructif des Merveilles de la Nature.

PENDANT que la Suéde, qui ſe glorifie d'honorer en Vôtre Perſonne une Reine Philoſophe, admire Vôtre Magnificence & Vôtre Choix dans la riche Collection des Curioſités Naturelles, dont le Cabinet de VÔTRE MAJESTÉ eſt compoſé, toute l'Europe ſait que ce Cabinet eſt comme un Sanctuaire des Muſes, ſur leſquelles Vous préſidés avec autant de Diſcernement que de Grandeur.

C'EST-LÀ, que ſous Vos yeux & à Vôtre imitation, s'eſt formé le Prince Royal, dont les Connoiſſances, & les Vertus, ſi ſupérieures à ſon âge, ſont la joie de la Nation, & l'étonnement de tous les Peuples. De-là, par Vôtre apui, mais plus encore par Vôtre exemple, Vous avez ſçû mériter aux Sciences & aux Beaux Arts d'être deſormais embellis par les mains d'un Sexe, que le prejugé en éloignoit. De-là, Vos attentions s'étendent de l'intérieur du Royaume juſques dans les Païs Etrangers à tout ce qui peut nourrir ou faciliter l'amour & l'étude des Lettres parmi Vos ſujets. Je dois aux nobles vûës de VÔTRE MAJESTÉ en ce genre le bonheur ineſtimable, dont je me glorifie, d'avoir été honoré d'un de ſes Régards.

IN-

INCAPABLE de m'élever au rang des Sçavans, tout ce que je peux faire dans ma profeſſion eſt de contribuer à repandre leurs Richeſſes Litteraires ſous une forme qui en aſſortiſſe le mérite, & de m'approprier, en ce ſens, celles que jai lieu de croire qui ſeront les mieux reçûes du Public.

SI je dois m'en rapporter aux Connoiſſeurs, l'*Eſſai ſur l'Hiſtoire Naturelle des Corallines, &c.*, qu'une plume habile a traduit en François à ma prière, eſt digne à plus d'un Titre, de paſſer ſous les yeux de VÔTRE MAJESTÉ.

C'EST un Syſtême d'une nouvelle Claſſe d'Etres juſqu'à preſent inconnus. L'Auteur, déja célébre par d'autres Ouvrages, qui lui ont fait un nom diſtingué entre les Naturaliſtes, y a décidé par les Obſervations les plus intéreſſantes & les plus exactes, la queſtion ſi long-tems débatue ſur la formation des Coraux, des Millepores, des Eponges, & d'autres ſemblables Productions Marines. Desormais on ne verra dans ces prétendues Plantes que les Demeures ſubtiles d'une multitude d'Animaux, ou plutôt qu'un Nouveau Monde, peuplé par des millions d'Habitans, auſſi remarquables par la diverſité de leurs formes, que par la ſingularité de leurs procedés induſtrieux pour leur conſervation. En repréſentant leurs Demeures dans un ordre méthodique, par des Figures auſſi élegantes qu'exactes, Mr. *Ellis* les a montrés eux mêmes tels que le Mi-

croſcope les découvre à des yeux tant ſoit peu faits aux Obſervations de ce Genre. Il a accompagné ces Figures d'Explications ſimples, courtes, claires, telles qu'on peut les attendre d'un Philoſophe qui ne parle que pour inſtruire, ſans chercher à ſurprendre par un vain éclat de paroles, ou à briller par des conjectures plus ingénieuſes que ſolides.

SI VÔTRE MAJESTÉ en juge de la ſorte, rien ne manquera à la gloire de l'Auteur. Son Ouvrage, marqué du Sceau de Vôtre approbation Royale, paſſera ſûrement à la Poſtérite, & je m'applaudirai toute ma vie d'avoir été aſſez heureux pour ne pas déplaire à une ſi grande Reine, en Vous préſentant cet *Eſſai* comme un Hommage, que m'a inſpiré l'Admiration Reſpectueuſe avec laquelle je ſuis

MADAME,

DE VOTRE MAJESTÉ,

Le très-humble, très-obeïſſant & très-ſoumis Serviteur,

P. DE HONDT.

A la Haye ce 20 Mars 1756.

AVER-

AVERTISSEMENT
DU
LIBRAIRE.

*MAlgré les progrès qu'on a fait juſqu'à préſent dans l'*HISTOIRE NATURELLE, *il reſtoit cependant une Claſſe de Corps, ſur leſquels les Sentimens étoient encore partagés; je veux parler de ces Productions Marines, qui ſont le ſujet de cet Ouvrage. On diſputoit ſi on devoit les ranger au nombre des Productions Animales, ou ſi elles n'étoient que de ſimples Végetaux; l'autorité de Mr.* De Reaumur, *ſi reſpectable pour tous les Naturaliſtes, avoit fait impreſſion ſur ceux qui admirent le goût & la juſteſſe, qui caractériſent tout ce qui ſort de ſa plume; après la Découverte des Polypes d'eau douce par Mr.* Trembley, *& les Obſervations de Mr.* Juſſieu, *cet Illuſtre Sçavant n'a pas héſité à regarder comme l'Ouvrage d'Animaux, pluſieurs de ces Corps Marins, que les Botaniſtes regardoient comme des Plantes. Mais parmi ces derniers, il y en a encore, qui ont de la peine à renoncer à un bien, qui ſemble leur appartenir à ſi juſte titre.*

Cet Ouvrage de Mr. Ellis *diſſipera leurs ſcrupules; il eſt rempli de tant d'Obſervations exactes & curieuſes, & qui prouvent ſi clairement que les* Corallines, *les* Kératophytes, *& la plûpart des autres Corps qui y ſont décrits, ſont des domiciles de différens Animaux, que les plus incrédules ſeront obligés d'en convenir.*

L'Auteur ne fait que rapporter ce qu'il a vû, & le détail qu'il en donne prouve qu'il a bien vû. La ſeule choſe qui pourroit arrêter le Lecteur, eſt ce qu'il dit ſur la Coralline repréſentée dans la Planche XIX. Fig. A. Il a cru avoir obſervé que les Polypes

Polypes qui y habitent, ſe changent en petits Limaçons à Coquilles. Quoique l'Hiſtoire Naturelle nous fourniſſe pluſieurs Métamorphoſes auſſi étonnantes que celle-là; cependant il y a quelques perſonnes qui ſoupçonnent que M. Ellis *pourroit bien avoir pris pour de petits Coquillages, les Oeufs des Polypes dont il s'agit. Averti de ce ſoupçon, Mr.* Ellis *a examiné la choſe de nouveau; mais juſqu'à preſent il n'a rien découvert qui ait dû le faire changer d'idée. Si dans la ſuite il fait là-deſſus quelqu'autre Obſervation, il eſt trop ami de la vérité, pour ne pas la communiquer d'abord au Public.*

C'eſt à Mr. le Profeſſeur Allamand *que je dois la ſatisfaction que j'ai de publier cet intéreſſant Ouvrage: je l'ai entrepris à ſa recommandation; & méme il a bien voulu me procurer un Traducteur, qui fut au fait des Matières dont il s'agit: il a de plus eu la bonté de revoir les dernières épreuves de chaque feuille, auſſi exactement que ſes occupations ont pû le lui permettre; ainſi je me flatte que cette Edition répondra parfaitement à l'Original, tant par la fidélité de la Traduction, que par ſes Planches, qui ſont celles-là méme que Mr.* Ellis *a fait graver pour ſon Edition Angloiſe, & qu'il m'a cedées.*

J'oze méme dire que mon Edition a un avantage par deſſus l'Original; c'eſt une Explication détaillée & très intéreſſante de la Planche XXXVIII., que Mr. Ellis *a donnée dans une Lettre qu'il a écrite à Mr.* Allamand *; & dont celui-ci a permis qu'on fit uſage dans cette Traduction.*

La Planche, qui eſt à la Tête de cet Ouvrage, repréſente des Groupes de différentes Corallines, que la Mer a laiſſé à decouvert dans une baſſe Marée.

TRA-

TRADUCTION

DES

DESCRIPTIONS LATINES,

qui ſe trouvent à la tête de

CHAQUE ARTICLE DE CET OUVRAGE.

CORALLINES VÉSICULEUSES.

N°. 1. *Coralline Véſiculeuſe, dont les branches ſont placées çà-&-là alternativement, avec des denticules oppoſées & cylindriques, dont les boucbes ſont ouvertes & crénelées.* Planche I. pag. 17

N°. 2 *Coralline marine en forme de Sapin, ou de Mouſſe de Mer, & ſemblable aux feuilles de la Fougère, Id.* 18

N°. 3. *Coralline, dont les branches ſont en petit nombre, & les denticules placées alternativement, & qui porte des Véſicules ridées transverſalement.* Planche II. 19

N°. 4. *Coralline ſemblable à de la Mouſſe, & dont la Tige eſt environnée de pluſieurs petites branches touffues, avec des denticules placées alternativement. Id.* 20

N°. 5. *Coralline en forme de Cyprès, dont les denticules émouſſées ne ſont pas placées dans un ordre exactement alterne; on voit ſortir de ſa Tige pluſieurs petites branches; ſes Véſicules ſont garnies de deux pointes.* Planche III. 21

Digitized by Google

N°. 6. *Coralline trainante & en forme de mouſſe, qui a des pédicules fort deliés, & des denticules oppoſées. Id.* ibid.

N°. 7. *Petite Coralline à pannache, avec des denticules, blanches, tendres & oppoſées, & des Véſicules qui reſſemblent à des Fleurs de Lis, ou de Pomme de Grénade, épanouïes.* Planche IV. 22

N°. 8. *Petite Coralline rampante, qui n'a qu'un petit nombre de branches & des denticules jointes enſemble par paires, ou deux à deux.* Planche V. 23

N°. 9. *Coralline Véſiculeuſe, ayant une Tige roide, dentelée, & finiſſant en une touffe de branches fourchues au ſommet, avec des denticules couchées de plat ſur les branches. Id.* 24

N°. 10. *Coralline droite à pannache, avec des denticules couchées de plat ſur les branches, & qui reſſemble à la Scolopendre, ou au Polypode.* Planche VI. 25

N°. 11. *Coralline en forme de mouſſe, dont les touffes & les branches ſont courbées en forme de faucille.* Planche VII. 26

N°. 12. *Coralline garnie de plumes & de coſſes, dont les denticules reſſemblent aux fleurs du Muguet.* Planche VII. 27

N°. 13. *Coralline, ayant des branches à pannaches, faites en forme de faucille, & reſſemblantes aux plumes de la queuë d'un Phaiſan, avec des houpes ſur ſa Tige.* Planche VIII. 28

N°. 14. *Coralline, reſſemblant aux antennes d'une Ecreviſſe de Mer, & Coralline remplie de branches capillaires.* Planche IX. 29

N°. 15. *Coralline droite tubuleuſe, ayant ſes petites branches diſpoſées en forme d'une Arrête de Harang.* Planche X. 32

N°. 16. *Coralline hériſſée de ſoies, & articulée comme un jonc, avec de petites branches capillaires, qui ſortent alternativement de chaque jointure.* Planche XI. 34

N°. 17. *Coralline gélatineuſe blanche, ſemblable a l'Algue, appellée* Conferva, *avec des articulations tendres & transparentes.* Planche XI. 35

N°. 18. *Coralline, qui a une Tige articulée, trainante, ſemblable à du fil, & imitant la nature de la corne, & qui porte des Véſicules avec des pédicules tors, aux Articulations des branches.* Planche XII. 37

N°. 19.

N°. 19. *Petite Coralline rampante, avec des pédicules noueux & articulés, & dont les Véſicules ſont placées alternativement aux articulations.* Planche XII. ibid.

N°. 20. *Coralline avec des branches, qui portent des Véſicules faites en forme de cloche, dont les pédicules capillaires & tors ſont diſpoſés comme ceux de la Prêle.* Planche XIII. 39

N°. 21. *Petite Coralline grimpante, qui porte des Véſicules faites en forme de Cloche, ſur le ſommet de ſes pédicules longs, déliés, & tors.* Planche XIV. 40

N°. 22. *Coralline qui eſt la plus petite de toutes, & dont les Véſicules ſont quelquefois diſpoſées en forme de branches ſeparées, & quelquefois ſerrées les unes contre les autres, comme une grappe de raiſins.* Planche XIII. 41

N°. 23. *Petite Coralline rampante, avec des denticules alternes, formées comme les Vaiſſeaux ſéminaux de la Luzerne.* Planche XV. 42

N°. 24. *Petite Coralline grimpante, avec un pédicule articulé, & dont les Véſicules ſont tellement arrangées ſur chaque articulation, qu'elles reſſemblent à la Flutte du Dieu Pan.* Planche XV. 43

N°. 25. *Petite Coralline rampante, avec des Véſicules ovales, adhérentes aux branches, comme une grappe de raiſins.* Planche XV. ibid.

N°. 26. *Petite Coralline rampante ſur un* Fucus, *en forme de Cuſcute; elle eſt garnie de branches déliées, placées à l'oppoſite les unes des autres. Aux jointures de ſes branches on voit de petites Véſicules ovales, en groupes.* Planche XIV. 44

CORALLINES TUBULEUSES.

N°. 1. *Coralline tubuleuſe, ridée comme le conduit de la reſpiration.* Planche XVI. 45

N°. 2. *Coralline tubuleuſe, ſemblable aux tuyaux d'Avoine.* Planche XVI. 46

N°. 3. *Coralline tubuleuſe, garnie de branches qui ſont torſes comme une vis, près de leur inſertion dans la tige.* Planche XVI & XVII. 47

CORALLINES CELLULEUSES.

N°. 1. *Coralline celluleuſe droite, avec pluſieurs touffes de branches fort tendres & garnies de plumes.* Planche XVIII. 48

Coralline, qui porte des Limaçons, de l'Amérique, & de la Mer Méditerranée; avec les Sections perpendiculaires & transverſales des Cellules en B en C. Planche XIX. 50

N°. 2. *Coralline celluleuſe droite, qui a des branches garnies de plumes, avec des petits globules teſtacées à leurs ſommets, & des figures ſemblables à des têtes d'Oiſeaux, placées ſur les côtés de ſes cellules.* Planche XX. 51

N°. 3. *Coralline celluleuſe rampante, avec de petits tubes ſemblables à des racines, qui ſortent de différents côtés de ces ramifications trainantes, par leſquelles elle s'attache aux* Fucus, *& aux coquilles. Quelques unes de ces branches ſont garnies çà-& -là de crochets.* Planche XX. 52

N°. 4. *Coralline celluleuſe rampante, avec des branches pierreuſes & caſſantes, & des Cellules, dont les côtés ſont angulaires.* Planche XX. 53

N°. 5. *Coralline celluleuſe, petite, droite, & garnie de branches, avec des Cellules en forme d'entonnoir, unies à la baſe, mais ſaillantes alternativement au ſommet; & qui ont de fort grandes ouvertures, dont le haut eſt environné de poils ſemblables aux cils des paupières.* Planche XX. ibid.

N°. 6. *Coralline celluleuſe de couleur d'yvoire, dont les ramifications ſont déliées, d'un tiſſu caſſant, & qui porte des Véſicules, avec des Cellules d'une forme tubuleuſe, un peu courbées, presque oppoſées les unes aux autres, & jointes enſemble.* Planche XXI. 54

N°. 7. *Coralline celluleuſe, & molle, qui a un très grand nombre de branches, & des articulations faites en forme de Cotte de maille.* Planche XXI. 55

N°. 8. *Petite Coralline celluleuſe, avec des branches compoſées de cellules applaties & rangées par paires, & qui reſſemble aux petites coſſes de la Plante appellée Bourſe à Berger.* Planche XXII. 56

N°. 9. *Coralline celluleuſe très petite avec des branches courbées comme une faucille, & compoſée de cellules ſimples, qui ont la forme d'une Corne de Taureau.* Planche XXII. 57

N°. 10. *Coralline celluleuſe très petite, avec des branches cruſtacées, courbées comme une faucille, & compoſées de cellules ſimples, qui ont la forme de corne de Chévres, & qui portent des Véſicules.* Planche XXI. ibid.

N°. 11.

N°. 11. *Coralline celluleuſe très petite, qui s'éléve de deſſus un Tube, & qui eſt compoſée de cellules ſimples, qui ont chacune la forme d'un Serpent.* Planche XXII. 58

CORALLINES ARTICULÉES.

N°. 1. *Coralline articulée, dont les articulations ſont longues, cylindriques & pierreuſes, qui ſe partagent en deux à méſure qu'elles s'étendent, qui ont leurs ſurfaces couvertes de tous côtés de cellules faites en loſanges, & qui ſont jointes enſemble par de petits tubes membraneux & pliants.* Planche XXIII. 60

N°. 2. *Coralline Angloiſe, ou Coralline blanche commune.* Planche XXIV. 62

N°. 3. *Coralline Angloiſe déliée & trainante, avec de courtes articulations.* Planche XXIV. 63

N°. 4. *Coralline Angloiſe droite, avec des branches garnies de panaches touffus, terminées en forme de lance; avec des articulations applaties ſur les côtés.* Planche XXIV. ibid.

N°. 5. *Coralline d'une couleur rougeâtre, avec des branches ſemblables à des Cheveux fins, & qui ſe partagent toûjours de deux en deux.* Planche XXIV. 64

N°. 6. *Petite Coralline blanche, avec des branches qui ſe partagent en deux, & des articulations en forme de cornes, croiſſant ſur un petit* Fucus *rond.* Planche XXIV. 65

N°. 7. *Coralline partagée en deux, avec des touffes épaiſſes, droites comme la crête d'un Oiſeau, portant des Véſicules ſemblables à des grains de ſémence, & trouvée croiſſant ſur un petit* Fucus *rond.* Planche XXIV. ibid.

N°. 8. *Coralline blanche qui porte des ſémences, & qui ſe termine par des cheveux très fins.* Planche XXIV. 66

N°. 9. *Petite Coralline, avec de courtes plumes blanches comme de la neige, croiſſant ſur un petit* Fucus *rond.* Planche XXIV. ibid.

Deux eſpèces de Corallines articulées de la Jamaïque, *appellées* Opuntia marina, *ou Figue des Indes.* Planche XXV. 67

Roſaire blanc, ou Coralline à grains de Chapelet de la Jamaïque. Planche XXV. 68

Coralline tubuleuſe & partagée en deux, de l'Iſle de Wight, *avec des tubercules qui couvrent ſa ſurface.* Planche XXVII. 69

KERATOPHYTES.

Keratophyte à panache de Sardagne, *appellé Plume de Mer.* Planche XXVI. 75

Kératophyte à réſeau, appellé Eventail de Venus. Planche XXIV. 76

Kératophyte rouge, ſpongieux. Planche XXVI. 79

N°. 1. *Kératophyte déployé comme un Eventail, & couvert d'une écorce pleine de Verrues.* Planche XXVII. 82

N°. 2. *Kératophyte partagé en deux, dont la tige & les branches ſont un peu applaties.* Planche XXVII. 83

ESCARES.

N°. 1. *Escare millepore à feuilles tendres & étroites, coupées par le bout, & couvertes des deux côtés de cellules oblongues, placées alternativement.* Planche XXVIII. 84

N°. 2. *Eſcare ſpongieuſe, & garnie de feuilles, couverte des deux côtés de cellules voutées, placées alternativement.* Planche XXIX. 85

N°. 3. *Eſcare millepore, pierreuſe, & garnie de feuilles qui ſe joignent enſemble irrégulièrement de côté & d'autre, & dont les deux ſuperficies ſont compoſées de cellules ovales.* Planche XXX. 86

Corail poreux appellé par Imperatus *Cornes de Cerf.* Planche XXX. 87

Cellules ſpongieuſes ovales, qui croiſſent ſur un Fucus. Planche XXX. ibid.

*Eſcare pierreuſe d'*Imperatus, *remplie de trous comme un filet.* Planche XXV. ibid.

N°. 4. *Eſcare millepore, ſpongieuſe, & garnie de feuilles, compoſée de cellules en forme d'un cone renverſé, & dont les ouvertures ſont environnées de Cheveux.* Planche XXXI. 88

Cellules des Inſectes communs de Mer, environnant un Fucus. Planche XXXI. ibid.

Cel-

Cellules des Inſectes de Mer communs, repréſentées groſſies au Microſcope ſur la ſurface d'un large Fucus. Planche XXIX. 89

La Polype de ces cellules. Planche XXIX. ibid.

N°. 5. *Eſcare appellée* Millepore Angloiſe *à grains de ſable, ou Cotte de maille marine d'*Imperatus. Planche XXV. ibid.

N°. 6. *Petite Eſcare millepore cruſtacée, avec des cellules en forme de tubes, de couleur d'un pourpre pâle, placées en rangs preſque égaux & parallèles.* Planche XXVII. 90

N°. 7. *Eſcare millepore pierreuſe, remplie de trous comme une pierre-ponce.* Planche XXVII. ibid.

CORAUX ANGLOIS.

N°. 1. *PEtit Corail Anglois garni de branches, & preſque auſſi dur que de la pierre.* Planche XXVII. 91

N°. 2. *Corail calcaire, & dont la forme reſſemble à celle de l'Hépatique.* Planche XXVII. ibid.

EPONGES.

N°. 1. *EPonge Angloiſe à branches.* Planche XXXII. 95

N°. 2. *Eponge ſemblable à la Mie de pain.* Planche XVI. ibid.

ALCYONS.

N°. 1. *ALcyon avec des lobes ſemblables aux poumons.* Planche XVII. 97

N°. 2. *Alcyon d'une ſubſtance molle, & dont la ſurface eſt toute parſemée d'étoiles.* Planche XXXII. 98

N°. 3. *Alcyon qui conſiſte en pluſieurs petites Ampoules jointes enſemble.* Planche XXXII. 99

Buccin de Virginie *en forme de Bouteille, ainſi nommé par le Docteur* Liſter. Planche XXXIII. 100

Cordon de Matrices, ou Ovaires de Buccin de Virginie. Planche XXXIII. ibid.

N°. 4.

N°. 4. *Alcyon, ou Coupe de Mer.* Planche XXXII. 101

N°. 5. *Alcyon appellé, par Mr.* Ray, Fucus *ſpongieux, à nœuds.* 102

AUTRES SUBSTANCES MARINES.

FUcus *de Mer ſemblable à une Plume de Coq-d'Inde.* Planche XXXIII. 103

Corail Anglois ſabloneux & tubuleux. Planche XXXVI. 104

Coralline Tubuleuſe de Malthe, *avec ſes Scolopendres, armées de deux bras ou griffes, qui ſont garnies d'un double rang de Plumes.* Planche XXXIV. 107

Une piéce du Corail commun, rouge & pierreux de la Méditerranée. Planche XXXV. 108

*Une piéce du Corail blanc tubuleux d'*Italie. Planche XXXV. ibid.

Polype de Mer, trouvé près du Pole, *conſiſtant en pluſieurs corps, qui ont chacun huit bras ou huit griffes, & qui étant joints enſemble à une baſe commune, ſont ſoûtenus par une tige oſſeuſe & fort longue.* Planche XXXVII. 110

De la manière dont les Animaux des Corallines Veſiculeuſes ſe multiplient. Planche XXXVIII. 115

Microſcope. Planche XXXIX. 124

Fin de la Table des Matières.

FAUTES À CORRIGER.

Pag. 50. en marge, au haut de la page, *ajoûtez* Planche XIX. Fig. a. A.
—— 92. lign. 18. ce Corail, *liſez*, de ce Corail.
—— 93. lign. 28. leur, *liſez*, leurs.
—— 97. marge au haut de la page, *ajoûtez*, Planche XVII. Fig. b. B.
—— 100. lign. 9. de la *Nouvelle-York* en *Virginie*, *liſez*, depuis la *Nouvelle-York*, juſqu'à la *Virginie*.
—— Ibid. lign. 29. qu'lls. *liſez*, qu'ils.
—— 102. lign. 20. là, *liſez*, la,
—— 108. lign. 2. ou, *liſez*, où.
—— 110. lign. 30. *de*, *liſez*, *du*.
—— 111. lign. 14. ſa, *liſez*, ſa.
—— 112. lign. 6. ou, *liſez*, où.

IN-

Digitized by Google

INTRODUCTION.

POUR inſtruire le Lecteur ſur la nature de cet Ouvrage, je ne ſaurois rien faire de mieux, que d'expoſer ici les raiſons qui m'ont engagé dans les Recherches qui en ſont le ſujet, les difficultés que j'y ai rencontrées, & les différens ſuccès que j'y ai eu.

VERS la fin de 1751. je reçus une curieuſe Collection de Plantes Marines & de Corallines, de l'Iſle d'*Angleſey*, ſituée au Nord du Païs de *Galles*, & une autre de *Dublin*. Pour conſerver quelques unes des plus rares de ces Plantes, celles ſur-tout qui ſe diſtinguoient par la beauté de leurs couleurs, je les étendis ſur du papier dans l'eau, en développant avec ſoin les filamens ſubtils de leurs ramifications, ſuivant la méthode de Mr. *Buttner*, célébre Botaniſte de *Berlin*, à qui je ſuis redevable de pluſieurs autres pratiques très-utiles dans la Botanique.

APRÈS que ces Plantes furent ſéchées, je les appliquai ſur des planches minces, couvertes d'une feuille de papier blanc, de façon qu'elles formoient une ſorte de Païſage, où elles s'élevoient ſur un fond varié par ſa forme & par ſes couleurs, & formé ſur-tout par deux ou trois eſpèces différentes d'Hépatique, ou de Mouſſes de Mer.

MON Ami, Mr. le Dr. *Hales*, voiant un jour avec plaiſir cette ſorte de Tableaux chez moi, voulut que j'en fiſſe de pareils pour S. A. R. Madame la Princeſſe Douairière de *Galles*,

afin que les jeunes Princeſſes ſes Filles s'amuſaſſent en les imitant; & pour cela il me pria de raſſembler toutes les differentes eſpèces de ces Plantes qui ſe trouvent ſur nos Côtes; ce que je fis, ſécondé par Mr. *George Shelvocke*, Sécrétaire au Bureau Général des Poſtes, & par quelques uns de mes amis en *Irlande*.

ENSUITE M. *Hales* me procura l'honneur de préſenter moi-même quelques-uns de ces Tableaux à Son Alteſſe Royale, qui les reçût avec cette bonté dont elle accompagne tout ce qu'Elle fait.

LA grande variété de ces Plantes que je reçus alors, me détermina à en ſéparer les différentes eſpèces, & à les ranger dans les Claſſes auxquelles elles appartiennent. En cela je pris pour guide le ſavant *Ray*, qui dans ſon Ouvrage intitulé *Synopſis Stirpium Britannicarum*, a traité, mieux à mon avis qu'aucun autre Auteur, de ces Productions Marines, auſſi bien que des Plantes originaires de la *Grande-Bretagne*, & de l'*Irlande*.

POUR diſtinguer plus exactement leurs caractères propres, je crus devoir les examiner au Microſcope; & avec ce ſecours je découvris bientôt, qu'elles ne différoient pas moins entr'elles par leur forme, que par la nature de leur compoſition: celle-ci me parut telle dans pluſieurs, que je fus plus porté à les ranger parmi les Productions Animales, qu'à les rapporter au Règne Végetal.

CELA me détermina à les ſéparer des autres, & à ranger toutes ces Productions Marines en trois Claſſes.

LA première comprenoit celles qui étoient manifeſtement des Nids ou des Cellules d'Animaux.

LA

LA ſeconde étoit compoſée de ces Corallines, dont la forme & les fines ramifications, tout-à-fait reſſemblantes à celles des Végetaux, me les firent prendre alors pour de véritables Plantes Marines.

ENFIN je rangeai dans la troiſiéme, les Corallines à articulations pierreuſes & les *Keratophytes*, qui me paroiſſoient tenir de la nature des Corps rangés dans les deux premières Claſſes.

J'EUS l'honneur de préſenter à la Société Royale, au mois de Juin 1752, cette Collection ainſi diſpoſée dans quatre Tableaux, que j'accompagnai d'une Diſſertation, où je décrivois ce qu'ils contenoient, comme je le croiois dans ce tems-là.

J'ÉTOIS déja convaincu par mes propres obſervations que pluſieurs de ces Corps, que juſqu'à préſent les Naturaliſtes avoient pris pour des Plantes Marines, n'étoient en effet que des Productions Animales; pluſieurs de ceux qui étoient dans l'Aſſemblée fortifiérent les doutes que j'avois ſur les autres, que je n'avois pas oſé reſtituer au Règne Animal.

POUR déterminer ce qu'il en falloit penſer, je ne trouvai point de meilleur expédient que d'aller examiner ces Corps ſur les lieux où ils ſe trouvent; & pour cela je me rendis au mois d'Août 1752. dans l'Iſle de *Sheppey*, près des Côtes de *Kent*, accompagné de Mr. *Brooking*, habile Deſſinateur, qui voulut bien ſe charger de faire les deſſeins dont j'aurois beſoin. Là, à l'aide d'un Microscope fait par Mr. *Cuff*, & que j'avois rendu propre à l'uſage auquel je le deſtinois, j'eus occaſion d'examiner dans l'eau même de la Mer ces Corallines, dont l'origine me paroiſſoit encore équivoque; mais bientôt mes doutes furent diſſipés; je fus pleinement convaincu que ces prétendues Plantes n'étoient autre choſe que des Nids

d'Animaux, que je vis vivans, & qui faiſoient ſortir des Cellules, où ils étoient renfermés, une ſorte d'organes ſemblables à de petites branches ou à des filamens; ces Animaux, dont le domicile étoit fixé ſur des Coquilles d'Huitres, de Moules, ou ſur quelqu'autre Corps, étoient du nombre de ceux qui ne ſe donnent aucun mouvement pour changer de demeure.

La première Coralline que j'obſervai fut celle qui eſt repréſentée dans la Planche II. N°. 3. Ce que j'y remarquai de vivant ſe voit en A. groſſi au Microſcope. Cette découverte, jointe à quelques autres obſervations que je fis en même tems, m'engagea à faire retirer des mains de la Société le Mémoire que je lui avois remis; & je réſolus de pouſſer plus loin mes recherches là-deſſus, tant pour ma propre ſatisfaction, que pour fournir à ceux qui étoient encore dans le doute, des preuves propres à les convaincre.

Au commencement de Juin 1754. j'engageai Mr. *Ehret*, connu de tous les Botaniſtes de l'Europe, par ſes beaux deſſeins de Plantes & de Fleurs, à m'accompagner jusqu'aux Côtes de la Mer près de *Brigthelmſtone*, en *Suſſex*, pour y deſſiner au naturel tout ce que le Microſcope nous feroit découvrir de remarquable dans ces Corallines. Je remis enſuite la Relation de ce Voyage, avec les deſſeins que j'avois fait faire, à la Société Royale, qui honora le tout de ſon approbation. Entr'autres Corallines que nous vimes dans cet endroit, fut celle qui eſt repréſentée avec ſes fines ramifications étendues dans la Planche IX. N°. 14. *b*. En C. eſt une de ſes branches, telle que nous la vimes dans l'eau avec le Microſcope, & où paroiſſent les Polypes dont elle eſt chargée, renfermés en partie dans leurs Cellules d'où ils ſont ſortir leurs bras.

Nous eûmes auſſi le plaiſir de voir en mouvement les Corallines dont les Polypes ſont contenus dans des eſpèces de gobelets, ſoutenus par un long pédicule, compoſé d'anneaux,

neaux, ou fait en forme de vis. (Voyez Planche XII. Fig. C.) Au milieu de ce pédicule, qui étoit transparent, nous pouvions aiſément diſtinguer un filet fort délié qui partoit du corps de l'Animal.

En obſervant cette Coralline, nous découvrimes par hazard ces Polypes qui diſtribuent leurs Cellules ſur des *Fucus*, ou autres Corps Marins. On voit la figure de ces Cellules Planche XXIX. D. & l'Animal dans ſa Cellule en D. 1.

En différens endroits de ces Corallines, il y a de petits Corps, qui vus au Microſcope paroiſſent comme autant de Véſicules. J'en avois ignoré juſqu'alors l'uſage; mais je découvris dans ce Voyage que c'étoient des Matrices ou des Habitations de jeunes Polypes qui ſortoient du Corps de leur Mère, comme ceux d'eau douce, avec cette ſeule différence, c'eſt que le Corps de nos Polypes Marins eſt à l'abri ſous cette couverture véſiculaire. Ces Véſicules paroiſſent en différentes ſaiſons de l'année, ſuivant qu'elles ſe trouvent ſur des Corallines de différentes eſpèces, & enſuite elles tombent comme les fleurs ou les ſemences des Plantes. Cela a fait que quelques Naturaliſtes, qui n'ont pas eu occaſion d'y voir les Animaux vivans, ont cru que c'étoient réëllement des ſemences de Plantes; & j'étois dans la même idée, lorſque je remis en 1752. mon Mémoire à la Société Royale; je m'y étois appliqué à rendre ſenſible la grande reſſemblance qu'il y a entre ces Véſicules, & les denticulations de quelques unes de ces Corallines, & entre les feuilles dentelées de quelques eſpèces de Mouſſes terreſtres, particuliérement de celles qui ſont connues des Botaniſtes ſous les noms de *Hypnum* & *Bryum*. On voit une de ces Corallines Planch. III. B. & une autre Planch. V. B.

Quelques Auteurs, pour n'avoir pas examiné ces Corallines animées dans l'eau de la Mer, qui eſt leur élément propre, ſont tombés dans une autre erreur: ils ont cru que

ces Véſicules étoient uniquement des ampoulles flottantes qui ſoutiennent les Corallines ſur l'eau, & reſſemblent à celles de l'*Acinaire* & du *Chêne de Mer*.

On voit deux de ces Véſicules, avec les Polypes qu'elles contiennent, groſſies au Microſcope, au milieu de la Figure A. de la Planche V.

C'est avec raiſon qu'on donne le nom de denticulées à ces Corallines, leurs Véſicules reſſemblent tout-à-fait à des dents, placées à l'oppoſite l'une de l'autre ſur les côtés des tiges ou des branches.

Les grands Polypes qui y habitent ſont joints par un filet délié à la partie charnue, qui occupe le milieu de toute la Coralline.

Quelquesfois ces Animaux paroiſſent entortillés en rond dans leurs Véſicules: cela arrive lorſqu'ils ſont encore dans l'état d'Embryons; on en voit de tels dans la Planche XI. C. A meſure qu'ils groſſiſſent, & qu'ils approchent, ſi je puis parler ainſi, de la maturité, le ſommet de la Véſicule commence à s'ouvrir, l'Animal s'avance en dehors, & déployant ſes bras cherche de côté & d'autre de quoi ſe nourrir; mais au moindre mouvement qui ſe fait autour de lui, il ſe contracte promptement, & ſe retire au fond de ſa Véſicule qui ſe referme en même tems.

Des Véſicules de quelques eſpèces de Corallines, ont un petit couvercle élaſtique, qui en ferme l'entrée, dès que l'Animal s'eſt retiré au fond: on en voit une de ce genre dans la Planche III. B.

Quand ces Polypes à Véſicules ſont parvenus à leur maturité, ils tombent, & la pluſpart des Véſicules diſparoiſſent avec eux.

Dans

DANS quelques Corallines à Cellules, remarquables par la beauté de leur ramification, j'obſervai que les petits Polypes qui y habitent, acquéroient une couverture teſtacée, ou une Coquille ſemblable à celle des petits Limaçons. Voiez Planche XVIII. Fig. E. & B. & Planche XIX. Fig. A.

CES petits Poiſſons à Coquilles, groſſiſſent ſans doute, & lorſqu'ils ont acquis toute leur grandeur, il eſt apparent qu'ils dépoſent ſur des Pierres, des Coquillages, ou ſur des Plantes, ces Matrices ou Ovaires, qui ſe développant & s'étendant avec le tems, prennent une forme ſi reſſemblante à celle des Plantes, qu'au premier coup d'œil on les croit être des Plantes réëlles. Voiez la Planche XXXIII. Fig. *a.*

POUR m'inſtruire mieux encore ſur la nature de cette eſpèce de Corps, preſque inconnue juſqu'à préſent, je fis en Août 1754. un Voyage ſur les Côtes Septentrionales du Comté de *Kent*, accompagné de Mr. *Oeder*, Docteur en Médecine & Botaniſte du Roi de Dannemarc.

A *Whitſtable* j'emploiai quelques Pêcheurs à me raſſembler toutes les différentes eſpèces de ces Productions Marines qu'ils pourroient trouver. Entre pluſieurs autres choſes ils m'apportérent divers Corps irréguliers, de ſubſtance charnue, attachés à des Coquillages, & qu'ils appellent Orteils de Morts. *Ray* les décrit dans ſa *Synopſis*, & les nomme *Alcyonium ramoſodigitatum molle aſtericis undiquaque ornatum.* On en voit une petite pièce repréſentée de grandeur naturelle dans la Planche XXXII. Fig. *a*, & une partie de la même piéce groſſie au Microſcope Fig. A.

JE les reçus dans un ſçeau rempli d'eau de Mer; & je les laiſſai tranquilles, juſqu'à-ce que les Polypes renfermés dans leurs cellules étoilées, où ils étoient fixés par leurs queuës, ſe fuſſent étendus; alors les rétirant bruſquement de l'eau

l'eau ſalée & les plongeant dans de l'eſprit de vin, il y eut pluſieurs de ces Animaux qui moururent ſans avoir le tems de ſe contracter, & de ſe retirer dans leurs cellules. Par-là je parvins à conſerver ces petits Animaux, de même que ceux de pluſieurs autres Productions Marines, dans leur forme naturelle. Ce moyen me réüſſit ſur-tout avec cette eſpèce d'Alcyon qui reſſemble aux lobes des Poumons, & que les Pêcheurs appellent Figue de Mer, parce qu'il renferme pluſieurs grains jaunes aſſez ſemblables à des ſémences. On en voit un repreſenté dans la Planche XVII. Fig. *b*. Sa ſurface extérieure, vûe au Microſcope, me parut parſemée de petites étoiles, repréſentées dans la même Planche Fig. B, C, D.

Ce fut alors auſſi que j'obſervai, pour la première fois, des Animaux vivans dans cette eſpèce de Coralline qui eſt repréſentée dans la Planche XI. Fig. A. dans celle que ſa figure fait appeller Epine de Harang; voiez Planche X. Fig. A. & dans les Corallines à ramifications tubuleuſes, dont on voit la Figure, groſſie au Microſcope, dans la Planche XVII. Fig. A. Ce fut là encore que je remarquai des Animaux ſur la Coralline à cellules, qui ſe trouve groſſie auſſi au Microſcope, dans la Planche XX. Fig. C. A mon rétour à Londres, je trouvai la pluspart de ces Polypes fort bien conſervés dans l'eſprit de vin où je les avois mis, quoiqu'ils y fuſſent entaſſés avec divers autres Corps plus ſolides, tels que des Etoiles de Mer, & des Alcyons adhérans à des Coquilles.

M'étant ainſi convaincu que la méthode de tremper les Corallines dans l'eſprit de vin, les conſerve avec leurs Animaux, ſans aucune altération; je crois faire plaiſir aux Naturaliſtes en la décrivant plus amplement; s'ils la ſuivent ils pourront faire venir des différentes Côtes de la Mer, les Corallines & les autres Productions Marines dont ils voudront connoître les habitans, ſans être obligés d'aller les examiner ſur les lieux.

Les

Les Corallines les plus variées ſe trouvent ſur les Rochers, ou ſur les bancs d'Huitres, qui ont été négligés pendant quelque tems, au moins c'eſt-là où je les ai vû le plus ſouvent en petits buiſſons. Dès que les Pêcheurs ont pris des Huitres qui en ſont chargées, il faut qu'ils les mettent promptement dans un ſçeau rempli d'eau de Mer, car les Animaux, qui y habitent, ſont ſi tendres qu'ils ne s'auroient être un moment dans l'air ſans ſe rider ; après quoi on doit les tranſporter ſur le rivage, & les détacher avec des pinces de deſſus les Coquilles, pour les plonger doucement dans un baſſin rempli d'eau de Mer bien pure. Au bout d'une heure, ou peut-être même en moins de tems, une loupe d'environ deux pouces de foyer fait voir la Plante toute hériſſée de Polypes, qui revenus de la violence qu'on leur a faite, commencent à étendre leurs bras. Alors on ſaiſit bruſquement ceux qu'on voit vivans, & on les plonge au moment même dans un vaſe rempli d'eſprit de vin, qu'on doit avoir à ſes côtés ; par-là on ôte la vie à ces Animaux, ſans leur laiſſer le tems de ſe contracter. Des flaccons remplis de diverſes Productions Marines, ainſi raſſemblées, peuvent être envoyés à quelque diſtance que ce ſoit, ſans que la figure des Polypes en ſoit en aucune façon dérangée.

On peut encore emploier cette autre méthode. Placez les Huitres chargées de Corallines, dans un grand Vaſe de terre ou de bois, avec autant d'eau qu'il en faut pour couvrir les Corallines, & pas davantage. Laiſſez le tout en repos pendant une heure ; alors verſez doucement ſur les bords du vaſe, autant d'eau bouillante qu'il y a d'eau froide. Celà fait, ôtez promptement les Corallines de deſſus les Coquilles, & mettez les dans des flaccons remplis d'eſprit de vin. Si enſuite vous voulez les examiner, il faut ſéparer les différentes eſpèces, & les mettre à part dans des bouteilles de Cryſtal remplies d'un eſprit de vin bien clair, mais qui ne ſoit pas plus fort que de la bonne eau de vie : ces bouteilles doivent être longues & avoir

une large ouverture, & il ne faut pas que leur Diamètre excède la longueur du foier de la loupe avec laquelle vous vous propoſez de faire vos obſervations. Quand ces bouteilles ſont bouchées de façon à empêcher l'évaporation, cette méthode eſt la meilleure qu'on puiſſe ſuivre, pour conſerver ces Plantes animées, de manière qu'en les voyant, les plus incrédules ne peuvent ſe méprendre ſur leur Nature & ſur leur Origine.

Il eſt bon cependant d'avertir ici, qu'il faut faire ces ſortes de Collections en été ; car pendant l'hiver ces Animalcules ſont ordinairement contractés & engourdis par le froid.

Les obſervations que j'avois faites ſur les Corallines véſiculeuſes, & à cellules, me donnérent les premières idées qui m'ont fait connoître la formation des *Kératophytes*. Découverte qui me fit d'autant plus de plaiſir, qu'encore à préſent cette Claſſe de Corps eſt rangée, par les plus exacts Naturaliſtes, parmi les Végetaux, mais couverts ou incruſtés accidentellement en différens endroits, comme pluſieurs autres Plantes, de nids de divers Inſectes qui leur ſont propres.

On trouve dans les Cabinets des Curieux quelques eſpèces de ces *Kératophytes*, qui ont tant de rapport avec quelques-unes de nos Corallines véſiculeuſes à larges denticules, qu'il n'eſt guères poſſible de les rapporter à différentes Claſſes. On en voit un repréſenté dans la Planche XXVI. Fig. S.

Quant aux *Kératophytes* des autres eſpèces, je trouve qu'ils reſſemblent aux Corallines véſiculeuſes, & aux Corallines à cellules, en des choſes ſi eſſentielles, que je ne doute point que ſi celles-ci appartiennent au Règne Animal, comme les obſervations que j'ai faites juſqu'à préſent me le perſuadent, les *Kératophytes* n'y appartiennent auſſi.

Qu'on

Qu'on ſe donne la peine de comparer ces Corps enſemble, & d'examiner attentivement la ſuite des petits tuyaux qui ſe changent inſenſiblement en ramifications celluleuſes, dans les *Kératophytes*, & qu'on conſidére en même-tems la ſtructure de cette Coralline véſiculeuſe, nommée Arrête de Harang, & répreſentée dans la Planche X. Fig. *a.* alors je crois pouvoir aſſurer qu'on ſera de mon opinion.

Ce qui fait ici de la peine aux Naturaliſtes, c'eſt cette ſubſtance, qui approche ſi fort du bois ou de la corne, dont une partie du tronc & des branches des *Kératophytes* eſt compoſée; comment en expliquer la formation, ſi l'on ne ſuppoſe pas que ces Corps ſont des Végetaux?

Mais au milieu de mes obſervations, je reçus heureuſe-d'*Amérique*, un très beau *Kératophyte*, de l'eſpèce de ceux qu'on nomme Eventail de Mer; on en voit une partie dans la Planche XXVI. Fig. C, O, D, K. Ce *Kératophyte*, comme on le verra par la deſcription que j'en donne, démontre clairement que des Animaux, du genre des Polypes, ſont les Architectes de cette croute ligneuſe ou ſemblable à la corne, de même que de la croute calcaire qui couvre une nombreuſe Colonie d'Inſectes.

Les *Eſcarres*, que j'ai rangées dans la Claſſe qui ſuit celle des *Kératophytes*, méritent qu'on les obſerve encore avec ſoin. Il ſemble que quelques unes ne ſont autre choſe que des Matrices ou des Ovaires de certaines eſpèces de Poiſſons à coquilles, qu'on a quelque raiſon de croire appartenir à la Claſſe des Bivalves. Je n'oſerois cependant rien affirmer là-deſſus, à cauſe de l'ignorance où nous ſommes ſur l'origine des Coquillages. Cette matière eſt encore ſi obſcure, que juſqu'à préſent nous ne connoiſſons pas même la formation des Coquillages bivalves les plus communs, tels que ſont les Moules, les Pé-

toncles, & les Huitres. Pluſieurs de ces Productions informes de la Mer, qu'on nomme *Alcyons*, ne méritent pas moins nôtre attention. Si nous pouvions examiner ces Corps en différentes ſaiſons, je ſuis perſuadé que nôtre curioſité ſeroit amplement ſatisfaite par les nouvelles découvertes que nous ferions.

Comme dans la ſuite de cet Ouvrage j'aurai ſouvent occaſion de parler de *Polypes*, il eſt à propos d'en donner ici une legère Deſcription en faveur de ceux qui ne connoiſſent pas encore ces Inſectes. Pour cela je ne puis rien faire de mieux que de décrire les Polypes d'eau douce, dont Mr. *Trembley*, Membre de la Société Royale, nous a fait connoitre les ſinguliéres propriétés.

On en voit un dans la Planche XXVIII. Fig. C. En y jettant les yeux, il ſera aiſé de comprendre ce que je veux dire lorſque je parle des Polypes de Mer, de leurs bras, de leurs griffes &c.

Le Polype d'eau douce eſt donc un Animal de la figure d'un Ver, & d'une ſubſtance auſſi molle que les cornes des Limaçons communs.

Par une des extrêmités de ſon corps, il eſt adhérent, comme par un ſuççoir, aux Plantes aquatiques, ou à d'autres Corps. Son autre extrêmité, qui eſt ſa tête, eſt environnée de pluſieurs filets ou bras, placés comme autant de rayons autour d'un centre. Ce centre eſt ſa bouche; & ces bras flexibles, & capables d'une extention conſiderable, lui ſervent à ſaiſir des petits Vers, ou d'autres Inſectes aquatiques, & à les porter à ſa bouche. Souvent on lui en voit avaller, qui ſont plus gros que lui, auſſi a-t'il à un dégré éminent la propriété de dilater ſa bouche beaucoup plus à pro-

proportion qu'aucun autre Animal. Après que ſon eſtomac a fait la digeſtion de ce qu'il a mangé, il rejette par ſa bouche ce qui ne ſauroit plus ſervir à ſa nourriture ; & il n'a pas d'autre ouverture viſible, pour donner iſſue à ſes excrémens.

Au bout de quelques jours, ſon corps paroit hériſſé de petits boutons ou mammelons, qui ſont de jeunes Polypes qui commencent à pouſſer. A méſure qu'ils grandiſſent, on voit ſortir de la circonférence de leur tête des fibres ou des filets déliés, ſemblables aux bras de celui à qui ils doivent la naiſſance ; auſſi s'en ſervent-ils bientôt au même uſage, en les emploiant à ſe procurer de la nourriture. Quand ils ont acquis toute leur grandeur ils pouſſent à leur tour, de la même manière, d'autres jeunes Polypes, qui ſortent auſſi de leurs Corps. Ainſi le même Animal ſe ſubdiviſe en pluſieurs ramifications, qui ſont autant de générations différentes, unies en même tems à la même ſouche, & diſpoſées comme on les voit dans la Planche que j'ai citée Fig. C. Quand un de ces jeunes attrape quelque nourriture, elle ne ſert pas uniquement pour lui, mais encore pour toute la famille: ce qu'il mange paſſant dans le Corps de tous les autres, contribue auſſi à les nourrir tous.

Un Polype d'eau douce reſſemble donc à une plante chargée de branches, ou compoſée de pluſieurs Corps dont chaqu'un a cette propriété ſinguliére ; c'eſt que ſi on le coupe en deux, la partie qu'on en détache devient un Animal complet ; en ſe fixant ſur une baſe, elle pouſſe en peu de tems des bras rangés en cercle comme ceux du Polype à qui il doit le jour ; ſa bouche ſe forme dans le centre ; il produit une nombreuſe famille ; en un mot, à tous égards, il eſt un Animal auſſi parfait que celui dont il a été ſéparé.

A en juger par les découvertes qui ont été faites juſques à préſent ſur les Polypes Marins, on eſt autoriſé à dire que ces Animaux, quoique différens pour la forme de ceux d'eau douce, ſe nourriſſent, croiſſent & multiplient de la même maniére. Au moins ai-je ſouvent obſervé que quand j'en coupois quelque partie, pour la mieux conſiderer, bientôt elle me donnoit des preuves que non ſeulement il y reſtoit un principe de vie, mais qu'encore elle avoit la faculté de croitre & de multiplier conſidérablement.

ESSAI

D'UNE NOUVELLE

HISTOIRE NATURELLE

DES

CORALLINES

&c. &c.

CHAPITRE I.

Des Corallines *en Général.*

POUR me rendre plus intelligible, en parlant des différentes Productions Marines, qui ſont le ſujet de cet Ouvrage, je me vois en quelque façon obligé de me conformer au langage de ceux, qui les regardant comme des Plantes Marines, les ont rangées ſous certaines claſſes, adoptées par les Botaniſtes. Je ſuivrai donc l'ordre qu'a ſuivi *Ray*, & je les diviſerai en *Coraux*, en *Corallines*, en *Kératophytes*, en *Eſcarres*, en *Eponges* & en *Alcyons*. Mais en déterminant les différentes eſpèces, je ferai plus attention à la reſſemblance que je trouverai entre les tiſſus de ces differens Corps, & entre les Animaux qui y habitent, qu'à leur forme extérieure, que les Botaniſtes conſidérent uniquement.

EN ſuivant cette Méthode, je devrois commencer par la deſcription des Coraux. Mais comme on en trouve très peu ſur les

les Côtes d'*Angleterre* & d'*Irlande*, & que leur compoſition eſt ſi compliquée, qu'on auroit peine à comprendre ce que j'en dirois, ſi je ne faiſois pas précéder la deſcription des Corps plus ſimples; je commencerai par les *Corallines*. Par ce mot j'entens des Productions Marines, qui ont la forme de Plantes, & qui ſont compoſées de pluſieurs branches minces, & ſubdiviſées en fines ramifications. Elles reſſemblent à quelques eſpèces de Mouſſes; auſſi les Botaniſtes les ont-ils rangées dans la même Claſſe.

Elles différent des véritables Plantes Marines par leur tiſſu, auſſi bien que par leur dureté, & par les principes que la Chymie en tire. Dans les Plantes Marines, qui méritent véritablement ce nom, telles que les *Algues*, les *Fucus* &c., la Diſtillation ne fait découvrir que peu ou point de ſel volatil; au lieu que les *Corallines* en donnent une très grande quantité: quand on les brule il s'en exhale une odeur ſemblable à celle de la corne, & des autres ſubſtances animales. Cela ſeul ſuffit pour prouver que ces Corps n'appartiennent pas tout-à-fait au Règne Végetal, malgré la conformité de leur forme avec celle des Plantes.

Pour ſuivre quelque méthode, dans la Deſcription que nous allons donner de ces *Corallines*, nous les diſtinguerons en véſiculeuſes, en tubuleuſes, en celluleuſes, & en *Corallines* compoſées de diverſes articulations. *Linnæus* a compris toutes ces différentes eſpèces ſous le nom de *Sertularia*, dans la Claſſe qu'il a formée des Corps, qui par leur Figure, reſſemblent au Corail.

Avant que d'aller plus loin, il eſt à propos de remarquer ici que les Deſcriptions, que je donne dans cet Ouvrage, ſont faites la pluſpart d'après des Corallines qui m'ont été apportées de loin; quoique je n'aye rien épargné pour en avoir de fraiches, & pour les examiner ſur les bords mêmes de la Mer, toutes les fois que j'en ai eu l'occaſion.

Les

BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI

Plate 1



Digitized by Google

LES Corallines véſiculeuſes ſe diſtinguent par leur ſubſtance, qui approche de celle de la corne, & par des branchages qui ſont autant de tuyaux, diſpoſés de façon, qu'ils paroiſſent former une très jolie Plante. La pluſpart de ces Corallines ont leurs branches dentelées, comme les feuilles des Mouſſes. Dans certaine ſaiſon de l'année on les trouve chargées de petits Corps d'une forme determinée, & ſemblables à de petites Veſſies, qui tirent leur origine de différentes parties de la tige & des branches; chaque différente eſpèce a des Véſicules d'une figure particulière. Quand elles ſont ſéches, leur couleur eſt pour l'ordinaire jaunâtre, ou d'un brun pâle.

SI on les plonge dans l'eau, elles reprennent la forme qu'elles avoient dans la Mer, & ſe rempliſſent bientôt d'humidité, ce qui leur donne une couleur d'ambre à demi transparente, & les rend fort élaſtiques. On les trouve adhérentes aux rochers, aux coquilles, & aux fucus, par des petits tuyaux qui reſſemblent à des racines. Miſes dans le Vinaigre, elles n'y cauſent aucune efferveſcence.

CHAPITRE II.

Des Corallines *Véſiculeuſes.*

N°. 1. *Corallina veſiculata ſparſim & alternatim ramoſa, denticulis oppoſitis cylindricis, oribus crenatis, patulis.* Planche L. Fig. a. A.

Tamaris de Mer.

Cette Coralline a été priſe dans une eau fort profonde, près de l'Iſle de *Dalkey*, à l'entrée de la rade de *Dublin*. Ses branches ſont placées aſſez irrégulièrement, mais cependant alternativement de différens côtés. Son tiſſu reſſemble à celui de la corne, & eſt transparent. Ses denticules ſont grandes, cylindri-

Digitized by Google

ques, ouvertes, & oppoſées les unes aux autres, & chaque paire paroit attachée au ſommet de celle qui eſt au deſſous.

La forme des Véſicules approche un peu de celle d'un cœur; elles ont à leur ſommet un petit tube, qu'on pourroit comparer au tronc de l'Aorte ou de la Veine cave. On en voit une, groſſie au Microscope, en A.

N°. 1. Fig. a. eſt une partie de cette même Coralline, de grandeur naturelle. En A. les denticules ſont repréſentées telles qu'on les voit avec le cinquième verre du Microſcope ſimple de *Wilſon*.

Planche I. Fig. b. B.

N°. 2. *Corallina Marina Abietis forma.* Tournef. J. R. H. 571.

Muſcus Marinus Filicis folio. H. Ox. Vol. III. p. 65. Tab. 9. Fig. I.

Sapin de Mer.

Cette Coralline s'attache aux Huitres, aux Moules, & à d'autres Corps, par une racine tubuleuſe & ridée, qui forme diverſes tiges roides, creuſes, & d'une ſubſtance ſemblable à celle de la corne: cette tige pouſſe alternativement, de côté & d'autre, des branches régulières, qui la font reſſembler à un petit Sapin, ou ſuivant d'autres, à une plante de Fougère; parce que ces branches s'étendent ſuivant une direction ſemblable à celle des feuilles de cette plante.

Ses denticules alternent de côté & d'autre, & ont une ouverture étroite. On obſerve, en différens endroits de cette Coralline, des Véſicules ovales qui partent de la tige, avec l'intérieur de laquelle elles communiquent, par une petite ouverture qui eſt au fond de chaque Véſicule. Leur cou s'étreſſit près du ſommet comme celui d'une cruche. Sur quelques unes de ces Corallines, cueillies au mois d'Avril, j'ai obſervé des reſtes d'Animalcules ſemblables à des Polypes, fixés par

Digitized by Google


Plate II
b
N 3
a
C
B
N 4
A
C

par leur queuë à l'intérieur du cou des Véſicules, comme on les voit en B., où l'on a repréſenté un de ces Polypes mort, ſortant hors de ſa Véſicule. Pluſieurs de ces Corallines ſont rougeâtres, quoique preſque toutes les autres ſoient d'un jaune terni ou brunes. Souvent on en trouve qui ſont remplies de petites Coquilles en limaçon blanches, ſemblables à des petites cornes d'Ammon, & d'autres qui ſont chargées d'une eſpèce de petites Corallines, en forme de cloches, qu'on décrira dans la ſuite.

La Figure *b* repréſente cette Coralline dans ſa grandeur naturelle, fixée ſur une coquille de Moule. En B. on en voit une partie groſſie au Microſcope.

N°. 3. *Corallina minus ramoſa alterna vice denticulata, lenticulis lineis transverſis externe ſtriatis.* R. S. p. 35. N. 13. Planche II. Fig. *a.* A. *b.* B.
Coralline à grandes dentelures.

Il y a deux eſpèces de ces Corallines; les unes croiſſent fort droit; les autres ſont plus branchues, & pouſſent un jet plus oblique.

La première eſpèce ſe trouve en très grande quantité ſur des Huitres près de *Queenborough* dans l'Iſle de *Scheppey.*

Ces Corallines ont peu de branches: leur tige eſt mince, & contournée en forme de vis entre les denticules: ces denticules ſont grandes; leur figure approche de celle d'une cruche, & elles ſont placées alternativement ſur les côtés oppoſés. Aïant fait pêcher pluſieurs de ces Corallines à *Queenborough*, je les tins pendant quelque tems dans un vaſe rempli d'eau de Mer, & enſuite j'y vis avec le Microſcope un Polype qui occupoit tout l'intérieur de chaque Coralline, & chaque denticule étoit remplie par une partie de l'Animal, qui ſe terminoit en une touffe de bras ou de griffes auſſi déliées que des cheveux, & qui ſe remuoient de côté & d'autre, avec beaucoup

Digitized by Google

de viteſſe. Voyez la Fig. A., où j'ai fait repréſenter une Véſicule vuë avec le même Microſcope, afin qu'on puiſſe juger de ſa grandeur par rapport aux denticules. L'Animal qu'elle contenoit étoit mort.

LA Fig. *a.*, offre une Coquille de Moule, avec pluſieurs jets de cette Coralline, tels qu'on les trouve ordinairement. Une petite pièce d'un de ces jets, ayant été miſe dans un verre de montre rempli d'eau de Mer, malgré ſa ſéparation du reſte du Corps, on en vit ſortir au bout de cinq minutes des bras ou filets qui cherchoient quelque proie en ſe mouvant de différens côtés.

L'AUTRE eſpèce de ces Corallines, qui a plus de ramifications, & croit plus obliquement, ſe voit de grandeur naturelle en *b*, & groſſie au Microſcope en B. Ses denticules ſont plus ſéparées, & leur bouche eſt plus large: Les Véſicules de l'une & de l'autre eſpèce ſont ridées.

Planche II. Fig. *c.* C. N°. 4. *Corallina Muſcoſa alterna vice denticulata, ramulis in creberrima capillamenta ſparſis.* R. S. N°. 17. pag. 36. Queuë d'Ecureuil.

CETTE belle eſpèce de Corallines à plumes eſt très commune ſur toutes les Côtes, qui ſont à l'Eſt de *Sheerneſs*, dans l'Iſle de *Scheppey*, au rapport des Pêcheurs, qui les trouvent en très grande quantité ſur les Huitres, particulièrement ſur celles qu'ils appellent Huitres de rocher.

ELLES pouſſent un jet fort droit, chargé d'une touffe épaiſſe de branches dont les denticules alternent de côté & d'autre; ces branches environnent la tige depuis ſa racine juſqu'à ſon ſommet, & y ſont placées en ſpirale, comme ſur les pas d'une vis. On en voit une de grandeur naturelle en *c*. Quoique les denticules ſoient diſtribuées par paires, elles ne

Digitized by Google

BIBLIOTECA NAZIONALE
NAPOLI

Digitized by Google

Plate III

ne ſont pas exactement oppoſées l'une à l'autre : elles ſont pointuës, & tant ſoit peu contournées en dedans, comme les cornes d'un Taureau. La Fig. C., qui les repréſente groſſies au Microſcope, en donnera une juſte idée. Leurs Véſicules ſont évaſées, & ſouvent on les trouve vuides & tranſparentes : mais au Printems on les apporte remplies d'une ſubſtance viſqueuſe & jaunâtre, qui, à en juger par ſa reſſemblance avec ce qu'on trouve dans les Véſicules des autres Corallines qui ſont mieux connues, doit être un Animal mort.

N°. 5. *Corallina Cupreſſi forma, denticulis obtuſis, paululum alternis, ramulis in exigua & rariora capillamenta ſparſis, Veſiculis bidentibus.* Planche III. Fig. a. A.

Cyprès de Mer.

CETTE Coralline ſe trouve dans les eaux profondes, le long des Côtes ſeptentrionales de l'Angleterre & de l'Irlande : Elle reſſemble beaucoup à celle que nous venons de décrire, & n'en différe qu'en ce que ſes denticules ſont émouſſées, qu'elles ne ſont pas recourbées, comme celles de la précédente, mais droites, & qu'elles ſont plus étroitement unies à l'un des côtés de la tige.

SES branches ſont auſſi plus longues & plus déliées, & la tige du milieu plus groſſe. On en voit une repréſentée de grandeur naturelle, dans la Planche III. N°. 5. Fig. a. Chaque Véſicule a au ſommet deux pointes aiguës, & contient la même eſpèce de ſubſtance que la précédente. La Fig. A. en repréſente une petite branche groſſie au Microſcope, avec ſes Véſicules, & un Polype mort qui s'y trouve attaché.

N°. 6. *Corallina Muſcoſa denticulata procumbens, caule tenuiſſimo denticellis ex adverſo ſitis.* R. S. p. 36. N°. 13. Planche III. Fig. b. B.

Cheveu de Mer.

CETTE Coralline, dont la forme eſt très belle & très régulière, eſt compoſée de branches longues & trainantes, qui ont des dents fort aiguës, & placées par paires, exactement oppoſées les unes aux autres : chaque paire ſemble être jointe à celle qui la ſuit : ſes petites branches croiſſent par touffes, comme une poignée de cheveux. Elle eſt repréſentée au naturel N°. 6. Fig. *b.* Ses Véſicules ſont fort grandes & tranſparentes, elles ont des couvercles réguliers; & le tout ne reſſemble pas mal à un Vaſe de porcelaine.

LA Fig. B. en repréſente une branche avec ſes Véſicules, groſſies au Microſcope.

LE couvercle des Véſicules de cette eſpèce reſſemble, par ſa figure, à celui de ces Mouſſes de terre, qu'on appelle *Hypnum* & *Bryum.*

Planche IV. Fig. *a.* A. N°. 7. *Corallina pumila pennata, denticulis teneris, albis & oppoſitis; Veſiculis, florem lilii, vel mali punicæ, ſe expandentem referentibus.*

Coralline à Fleur de Lis ou de Pomme de Grenade.

CETTE belle Coralline ſe trouve ſouvent ſur le Cyprès de Mer, décrit N°. 5. Elle l'embraſſe avec ſes petits tubes, & pouſſe de-là des branches, garnies de petites denticules oppoſées les unes autres, d'une forme cylindrique, & qui s'affaiſſent par le haut à meſure qu'elles ſe ſéchent.

ON en voit quelques unes, N°. 7. Fig. *a.* Elles y ſont repréſentées de grandeur naturelle, & croiſſant ſur une autre Coralline.

DE toutes les eſpèces de Corallines, il n'y en a point qui reſſemble plus à une fleur, que celle-ci: ſes Véſicules, groſſies au Microſcope, ont la figure d'une fleur de Lis ou de Pomme de Grenade, qui commence à s'ouvrir.

LA

Plate IV



Digitized by Google

Digitized by Google


Plate V
A
N. 9
b
B
N. 8

La Fig. A. eſt une petite branche de cette Coralline, groſſie au Microſcope, avec ſes belles Véſicules.

En examinant cette même branche repréſentée en B., & groſſie auſſi au Microſcope, on remarque que les ramifications de cette Coralline ſe terminent quelquefois par de petits tubes contournés irrégulièrement, & peu différens de ceux qu'elles ont à leur origine.

J'ai Vu à *Brighthelmſtone* pluſieurs Corallines de cette eſpèce, qui pouſſoient un jet droit, ſur les coquilles d'Huitres auxquelles elles étoient adhérentes. On nous les apporta toutes fraîches, au moment même qu'on venoit de les tirer de la Mer. J'en pris une très petite branche, avec ſes Véſicules, & l'ayant miſe dans de l'eau de Mer, je découvris bientôt, à l'aide de mon Microſcope, que l'Animal renfermé dans la branche étoit en vie, & qu'il déploioit ſes petites griffes hors de ſes denticules: mais le corps même de l'Animal reſtoit contracté dans ſa Véſicule, & ne paroiſſoit pas ſe mouvoir.

Cette branche eſt repréſentée, dans la Fig. C., vuë au Microſcope. Mais les bras qui étoient repliés dans les Véſicules de la branche, Fig. A., ſont deploiés dans la Fig. C.

N°. 8. *Corallina pumila repens minus ramoſa, denticellis bijugis.* R. S. N°. 19. p. 37. Planche V. Fig. a. A.

Chêne de Mer.

Cette petite Coralline rampante s'éleve çà-&-là par des petits filamens *tubuleux*, qui couvrent la ſurface du *Fucus* appellé Chêne de Mer, à feuilles larges & dentelées. On en trouve en quantité ſur les Côtes près de *Sheerneſs* dans l'Iſle de *Sheppey*. Cette même Coralline ſe trouve auſſi quelquefois rampante ſur le *Fucus* à coſſes.

Les

LES denticules ſont émouſſées à leur ouverture, & diſtribuées par paires exactement oppoſées les unes aux autres; Chaque paire ſemble être jointe à celle qui la ſuit. Les Véſicules ſont preſque globuleuſes & ſouvent ridées ou parſemées de ſillons qui ſe croiſent.

ELLE eſt repréſentée au naturel, Fig. *a.* N°. 8., & rampante ſur le *Fucus* Chêne de Mer. Dans la Fig. A. de la même Planche, on en voit une branche avec ſes Véſicules groſſies au Microſcope.

PENDANT que j'étois ſur les Côtes de *Suſſex* à *Brighthelmſtone*, je découvris pour la première fois, les Polypes vivans dans les Véſicules des Corallines dentelées, & ſurtout dans celles-ci. Ces Animaux ſont beaucoup plus grands dans les Véſicules que ceux qui ſe trouvent dans les denticules. Ils pouſſent ou croiſſent irrégulièrement ça-&-là, avec leurs Véſicules, des côtés de la tige & des branches.

ON voit aiſément, par le moyen du Microſcope, qu'ils ſont unis au Corps du Polype dont ils tirent leur origine. Ce dernier paroît n'être qu'une ſuite de chainons de petits Polypes rangés par paires jointes les unes aux autres par un filet charnu, qui paſſe par le milieu de la Coralline.

NOUS vîmes que les petits Polypes de cette eſpèce déployoient leurs griffes, pour attrapper leur proye, tout comme ceux des Corallines Véſiculeuſes.

ILS ſont repréſentés, Fig. A., tels qu'on les voit au Microſcope, lorſqu'on les examine tout frais.

Planche V. Fig. *b.* B. N°. 9. *Corallina Veſiculata, caule angulato rigido, ramis denſe ſtipatis & bifurcatis, terminantibus, denticulis cauli appreſſis. Fucus Equiſeti facie, Oſtreæ Teſtæ adnaſcens.* Sibbald. Scot. III. L. 1. p. 56. Tab. 12. R. S. N°. 47. p. 50. Goupillon.

CET-

Digitized by Google

Plate VI



Digitized by Google

CETTE Coralline s'élève de deſſus des petits tubes dont la ſubſtance approche de celle de la corne, & qu'on trouve fortement attachés ſur les Coquilles de Mer.

SA tige eſt droite, ferme, & couverte de nœuds, qui terminent les angles alternativement oppoſés les uns aux autres, & qui ſemblent être les extrêmités d'autant de branches rompuës.

LE ſommet de la tige eſt ordinairement couvert d'une touffe épaiſſe de branches fort courtes & ſerrées, les unes contre les autres. On la voit repréſentée de grandeur naturelle, N°. 9. Fig. b.

LES branches ont à chaque diviſion deux pointes ou deux eſpèces de cornes. Les denticules ſont ſi étroitement appliquées aux branches, qu'on peut à peine les diſtinguer ſans Microſcope: Mais par le moyen de cet inſtrument, on remarque que chaque denticule a, comme la pluſpart des autres, un petit trou à ſon ſommet.

LES Véſicules ſont placées au fond des branches, & paroiſſent être d'une figure ovale: Elles ont pour la pluſpart un petit couvercle à leur ſommet.

ON les trouve le long des Côtes d'*Ecoſſe*, & au Nord de l'*Angleterre*; ſur-tout aux environs de *Scarborough* où on leur a donné le nom de Goupillon.

LA Fig. B. repréſente une partie d'une branche groſſie au Microſcope, avec ſes Véſicules.

N°. 10. *Corallina erecta pennata, denticulis alternis cauli appreſſis, Lonchitis vel Polypodii facie.* Planche VI. Fig. 2. A.
Scolopendre ou Polypode de Mer.

CETTE Coralline, qui eſt droite & d'une ſubſtance ſemblable

blable à celle de la corne, a deux rangées de branches droites, creuſes, un peu applaties, & placées ſur la tige du milieu, à l'oppoſite les unes des autres. Ses branches pouſſent de côté & d'autre, comme de petites plumes parallèles, ſemblables aux feuilles du Polypode. Chacune eſt garnie de deux rangs de denticules oppoſées les unes aux autres, & qui ſont tellement enfoncées dans la branche, qu'elles ſemblent en faire partie, à leurs ſommets près, qui ſont ouverts & qui s'avancent tant ſoit peu en dehors. La tige principale eſt nouée de diſtance en diſtance comme un jonc.

Elle eſt repréſentée de grandeur naturelle N°. 10. Fig. *a.* On en voit une partie groſſie au Microſcope, Fig. A. de la même Planche.

Je n'ai encore reçu aucune Coralline de cette eſpèce avec ſes Véſicules, en aſſez bon état, pour que je puiſſe les décrire. Celle dont je parle a été trouvée depuis peu par des Pêcheurs près de la Rade de *Dublin*, parmi pluſieurs autres productions marines.

Planche VII. Fig. a. A.

N°. 11. *Corallina Muſcoſa pennata ramulis & capillamentis falcatis* R. S. N°. 16., p. 36.

Coralline à Faucille.

Cette belle Coralline, garnie de plumes, eſt attachée aux rochers, & aux coquilles ſur leſquelles on la trouve, par de petits tubes ridés: Elle pouſſe de là des tiges droites, ondées, & environnées dans toute leur hauteur de branches pannachées. Ces branches ont à leurs plus petites diviſions des rangs de denticules diſtribuées ſur le côté, qui, à méſure qu'elles ſe ſèchent, ſe recourbent en dedans, & prennent ainſi la forme d'une faucille.

Cette Coralline eſt repréſentée au naturel, Fig. *a.*, N°. 11.

Les

Digitized by Google

Plate VII

Digitized by Google

Les Véſicules ſont preſque d'une figure ovale renverſée: Elles ſont larges par le bas, mais elles vont en s'étréciſſant juſqu'au ſommet, où ſe trouve leur ouverture: Quelques unes de ces Véſicules paroiſſoient avoir au fond, une eſpèce de Calyce comme celui d'une fleur: La pluſpart de celles que j'ai examinées ne laiſſoient pas d'avoir, quoique ſéches, une ſubſtance viſqueuſe de couleur d'Orange, qui paroiſſoit être de la même nature que ce qui étoit contenu dans le reſte de la Coralline.

La Fig. A. repréſente une partie d'une branche, avec ſes petites ramifications faites en faucille, & ſes Véſicules groſſies au Microſcope.

Cette Coralline, qu'on trouve ſur le bord de la Mer dans pluſieurs endroits de la Grande Brétagne, eſt ſur tout très commune ſur les Côtes de *Kent*, près de *Sheerneſs*, dans l'Iſle de *Scheppey*.

N°. 12. *Corallina pennata & ſiliquata, denticulis florem lilium convallium referentibus.* Planche VII. Fig. *b.* B.

Pinnaria marina Imperati. Bocc. 257. N°. 6.

Coralline à Coſſes.

Cette Coralline ſe trouve ſur les Moules, & ſur d'autres coquilles, auxquelles elle eſt attachée par les petits tubes qui lui ſervent de racines: Elle pouſſe de-là de petites branches ſemblables à des plumes, qui ſe recourbent en ſe ſéchant, & prennent la forme d'une faucille: Les Denticules ſont rangées ſur le côté intérieur, & groſſies au Microſcope, elles reſſemblent au Muguet.

Cette Coralline ſe trouve auſſi ſur les tiges du *Fucus* à Coſſes, qu'elle environne avec ſes racines tubuleuſes, mais

Digitized by Google

ſans s'y attacher, comme on le voit N°. 12. Fig. 6., où elle eſt repréſentée de grandeur naturelle.

On voit s'élever ſur les branches, de petites Coſſes, garnies de pluſieurs côtes nouëuſes. Je remarquai, en les examinant au Microſcope, que quelques unes d'entr'elles contenoient de petits corps détachés comme des grains de ſemence: Mais après avoir diſſéqué la membrane déliée, qui ſert d'enveloppe à ces Coſſes tranſparentes, j'examinai ſoigneuſement, & en me ſervant des plus forts Microſcopes, ce qu'elles renfermoient; il me parût que le tout étoit de la même nature que ce qui ſe trouve dans les Véſicules des autres Corallines. La Fig. B., repréſente les Coſſes & les Denticules, telles qu'on les voit au Microſcope.

Cette Coralline ſe trouve ſur pluſieurs Côtes de ce Royaume: celle que je viens de décrire avec ſes Coſſes, fut trouvée par des Pêcheurs ſur la Côte d'*Irlande*, près de *Dublin*.

Planche VIII. Fig. a. A. N°. 13. *Corallina pennata & falcata, pennas caudæ Phaſiani referens caule gibboſo.*

Corallina fruticoſa pennata. Barr. Palma Marina. Barrel. Icon. 1292. n. 2.

Queuë de Phaiſan.

Cette Coralline, qui eſt très rare, croit à la hauteur de 10. ou 12. pouces. Sa racine conſiſte en une touffe irrégulière de tubes très déliés, & qui à l'œil ſimple paroiſſent être un morceau d'eponge. Pluſieurs de ces petits tubes s'élevant enſemble forment, en s'uniſſant étroitement, une tige ornée de cannelures & de denticules très belles, que le Microſcope y fait découvrir. Le dos de cette tige eſt garni de pluſieurs petits jets réguliers faits en forme d'arcade, placés à des diſtances preſque égales, applatis & un peu creux vers le milieu.

Cet-

Plate VIII



Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTECA NACIONAL

Digitized by Google


Plate IX
N. 14
b
C
a
A
B
H Roberts Sculp

CETTE Coralline eſt repréſentée au naturel, avec ſes racines ſpongieuſes. N°. 13. Fig. a.

LA tige principale eſt parſemée de ramifications, & ſes branches ſont à Pannaches tournées du même côté; & en ſe ſéchant, elles ſe recourbent, & prennent la forme d'une faucille.

LES Denticules qui reſſemblent à des gobelets à bords unis, ſont fixées dans des alveoles, & placées toutes du même côté, les unes ſur les autres, ayant leurs ouvertures ou leurs bouches tournées vers le haut.

LA Fig. A., repréſente une partie de la tige, groſſie au Microſcope, & l'on y voit la figure & la poſition de ſes Denticules.

CETTE belle Coralline, dans laquelle on n'a encore découvert aucune Véſicule, m'a été apportée par des Pêcheurs de *Dublin*, qui l'avoient tirée de la Mer, qui eſt fort profonde le long des Côtes de cette Ville.

N°. 14. *Corallina Aſtaci Corniculorum æmula.* R. S. N°. 10. pag. 34. & Planche IX. Fig. a. A.

Corallina ramoſa cirris obſita. R. S. N°. 11. pag. 35.

Antennes d'Ecréviſſe, ou Barbe de Mer.

CES deux Corallines, quoique diſtinguées en deux eſpèces par Mr. *Ray*, n'en font cependant qu'une.

CETTE diſtinction vient probablement de ce que leur forme varie, à méſure qu'elles changent d'état.

LA première paroit être compoſée extérieurement, d'un bout à l'autre, de jointures régulièrement placées comme les Antennes d'une Ecréviſſe de Mer, ou plustot comme les Ver-

Digitized by Google

tébres des Poiſſons; chaque articulation eſt environnée de petites branches capillaires, qui, groſſies au Microſcope, ont la figure d'une faucille, dont la courbure eſt tournée vers la principale tige. Leur côté intérieur eſt garni de petits alvéoles diſtribués régulièrement, qui ſoutiennent des Denticules ouvertes, faites en forme de gobelets, & ſi délicates, qu'on ne peut guères les découvrir que dans les Corallines qui ſont encore fraiches.

ENTRE les branches capillaires, nous avons remarqué ſur quelques Corallines, des petites Véſicules ovales, fixées ſur des pédicules, avec une ouverture placée un peu à côté du ſommet, & tournée vers la tige du milieu; & dans la pluſpart nous avons vû une ſubſtance jaunâtre, ſemblable à celle qu'on trouve dans les Véſicules des autres eſpèces. La tige entière, les branches, & les pédicules paroiſſoient creux, & avoir communication avec les Véſicules, même dans ces Corallines que nous trouvions ſur le rivage: Il eſt donc apparent que l'eau peut y paſſer librement, ſans que rien l'arrête.

LES racines de ces deux eſpèces de Corallines ſont compoſées, tout comme celle qui a été décrite dans l'Article précédent, de tubes ſpongieux très déliés, & entremêlés irrégulièrement les uns dans les autres; mais après les avoir ſéparés de la partie inferieure de la tige, nous découvrimes qu'ils en ſortoient régulièrement, & qu'ils étoient diſtribués autour des jointures, de la même manière que les branches pouſſent hors des articulations de la tige.

LA Coralline qui fait le ſujet de cet Article, ſe trouve repréſentée de grandeur naturelle, Fig. a,: Mais nous en avons ſouvent vû, qui étoient trois fois auſſi grandes que celle-ci.

LA Fig. A, repréſente une partie de l'une des tiges groſſie au Microſcope, afin de rendre ſenſible la forme des Véſicules, & la diſpoſition des branches.

ON

ON voit, Fig. B, la partie inférieure de l'une des tiges, & la manière dont les petits tubes qui lui ſervent de racines s'y inſinuent.

QUOIQUE Mr. *Ray* diſtingue ces deux Corallines en deux eſpèces, je crois cependant qu'elles n'en forment qu'une, & que toute la différence qui s'y trouve, c'eſt que l'une étant plus jeune & moins avancée, l'autre pouſſe déja des branches, & a ſes ramifications capillaires plus longues que l'autre.

PENDANT que j'étois ſur les Côtes de *Suſſex*, je trouvai cette Coralline adherente à une coquille d'Huitre, & en très bon état: L'Animal qu'elle contenoit étoit vivant.

J'EUS l'honneur, au mois de Juin paſſé, d'en préſenter une Deſcription à la Société Royale, & d'y joindre un très beau deſſein fait ſur les lieux, par Mr. *Ehret*.

LA Figure *b*. N°. 14., repréſente une de ces Corallines ſéches: celles que nous examinames dans de l'eau ſalée, ſur le bord de la Mer, avoient les petites fibres, dont leurs branches étoient garnies, plus étendues ou plus ſaillantes, & ſemblables à autant de petites plumes.

LA Fig. C., repréſente une de ces petites fibres, ou petites branches faites en faucille, & groſſie au Microſcope. On y voit auſſi l'Animal déployant ſes griffes hors des Denticules. Quoique cette petite branche paroiſſe compoſée de différentes articulations, cependant la partie charnue de l'Animal, qui eſt ici exprimée par le côté le plus obſcur de la Figure, paſſe ſans interruption à travers toutes ces jointures, comme dans tout autre petit Polype.

POUR deſſiner la Fig. C., nous nous ſommes ſervis du quatrième verre du Microſcope de *Wilſon*, & du ſixiéme pour repréſenter en A. les branches faites en faucille.

N°.

Planche X. N°. 15. *Corallina erecta, tubulosa, pennata, halecis spinæ facie.*

Corallina scruposa, pennata, cauliculis crassiusculis rigidis. R. S. N°. 15. p. 36.

Arrête de Hareng.

CETTE Coralline se trouve souvent attachée aux Huitres, qu'on apporte à Londres pendant l'Hyver.

ELLE pousse un jet haut de six à huit pouces, droit, ferme, mais très fragile, lorsqu'il est sec. La tige est composée d'un grand nombre de petits tubes, qui s'élévent presque parallélement les uns aux autres; dans quelques-unes j'en ai compté au de-là de cent sur une coupe transversale. Ces derniers paroissent sortir d'un grand nombre d'autres tubes de la même sorte, & entrelacés irrégulièrement l'un dans l'autre, comme un morceau d'éponge. Ils sont comme autant de racines qui soutiennent la Coralline sur les Coquilles d'Huitres, auxquelles ils sont attachés.

CETTE Coralline grossit par la jonction de ces racines tubuleuses qui s'élévent tout autour d'elles, & dont les dernières s'attachent fortement à la surface extérieure de celles qui les ont précédées. Quand elles ont fini leur crue, elles changent de figure, & prennent celle d'une branche, qui fait avec la tige un angle régulier de 45. degrès. Quoique ces branches soient alternativement opposées les unes aux autres, cependant leurs distances sont si bien proportionnées, qu'on les prendroit à la première vuë pour une Arrête de Hareng. Les alvéoles qu'on trouve sur ces branches sont aussi placés alternativement.

J'Y découvris pendant que j'étois à *Whitstable*, au mois d'Août dernier, des Denticules transparentes, fort délicates, & d'une figure cylindrique. Elles paroissoient être doubles, c'est-

Plate X



Digitized by Google

c'eſt-à-dire rangées l'une au-deſſus de l'autre, & renfermoient des Polypes qui étoient attachés, par leur partie inférieure, à une ſubſtance déliée & charnue, de la même nature que l'Animal même, & qui paſſoit viſiblement par le milieu des branches, & des tubes de la tige.

J'ai reçû quelques Corallines, de cette eſpèce, qui avoient été trouvées au mois d'Avril: leurs branches de côté étoient couvertes de pluſieurs rangs réguliers de Véſicules droites, & remplies pour la pluspart d'une ſubſtance de couleur jaune, & ſemblable à celle de pluſieurs autres Véſicules. Lorſque la Coralline eſt dans cet état, les Pêcheurs diſent qu'elle eſt en fleur.

La Figure de ces Véſicules eſt un Ovale irrégulier. On y découvre un tube qui ſort du pédicule, & qui d'un côté s'éleve un peu au deſſus de chaque Véſicule, à laquelle ce tube, qui eſt ouvert à ſon ſommet, paroit étroitement attaché.

Cette Coralline reſſemble beaucoup en petit à quelques-unes de ces Plumes de Mer, ou Kératophytes d'*Amérique*, qui croiſſent en forme de Panaches, & ſont revêtuës d'une croute compoſée de rangs réguliers de cellules, qui ſervent de domicile à de petits Animaux, & qui ſont placées le long des bords des branches.

On peut ſe former une idée de la formation de ces Coraux, compoſés de tubes qui ſe rempliſſent d'une matière pierreuſe, à méſure que ſe retirent les Animaux qui y demeurent, en faiſant attention à la manière dont le tronc & les branches de cette Coralline groſſiſſent. On voit s'élever tout autour de petits tubes qui ſe ſuccèdent continuellement, & qui s'attachent fortement les uns aux autres. On obſerve, de même, que quoique les tiges de cette Coralline ſoient formées d'une ſubſtance qui paroit être ſpongieuſe & élaſtique, cepen-

dant les tubes intérieurs deviennent fermes, opaques, & caſſans, pendant que les tubes extérieurs & plus récens ſont encore minces, tendres & tranſparens.

CETTE Coralline, eſt repréſentée dans ſon état naturel, avec la touffe de ſes racines ſpongieuſes, Fig. *a.* N°. 15.

LA Fig. A., eſt un petit Rejetton groſſi au Microſcope. On y voit les tubes dont il eſt compoſé, la forme de ſes Véſicules, & les Polypes contenus dans les Denticules.

LA Fig. C., repréſente le même Rejetton avec les alvéoles placés alternativement, & dans leſquelles ſont fixées les tendres & doubles Denticules qui contiennent les Polypes.

ON voit Fig. B., les petits tubes d'une partie de la tige, groſſie au Microſcope, mais un peu moins.

Planche XI. N°. 16. *Corallina ſetacea, inſtar arundinis geniculata, capillamentis ſingulis unicuique geniculo alternatim diſpoſitis.*
An Fucoides ſetaceum tenuiſſime alatum? R. S. N°. 6. p. 38.
An Fucoides ſetis minimis indiviſis conſtans? R. S. N°. 7. p. 39.
Coralline à Soyes.

CETTE petite Coralline, qui reſſemble à des ſoyes très rudes, croit ſur des coquilles de Moule, & ſur d'autres Corps marins. Celles qu'on trouve ſéches ſur le bord de la Mer ſont toutes tournées du même côté, tout comme ces autres petites Corallines repréſentées d'après nature ſur une coquille de Moule, au N°. 16.

EN examinant au Microſcope une des tiges de cette Coralline, elle parût être compoſée d'articulations comme un Jonc. Voyez la Fig. A. De la partie ſupérieure de ces jointures s'élevent de petites branches capillaires, placées alternativement, les unes par rapport aux autres. Ces branches ſont elles mêmes auſſi formées de différentes articulations: Celles-

ci

Plate XI



ci ont à leur partie ſupérieure des alvéoles, qui ſoûtiennent de petites Denticules en forme de gobelets, dans leſquelles je découvris des Polypes ſemblables à ceux que j'ai décrits en parlant de la Coralline à Antennes d'Ecreviſſe de Mer. Ils ſont repréſentés en A. On y voit auſſi les Véſicules qui, dans les Corallines ſéches, paroiſſent être faites en forme d'Olive. J'en ai vû une à *Brighthelmſtone* dont l'Animal venoit de ſe contracter: ſon ſommet dentelé la fait reſſembler à une Couronne. Elle eſt repréſentée dans la même Figure au deſſous des autres Véſicules. Je trouvai dernièrement à *Whitſtable* une très belle Coralline de cette eſpèce. Voyez la Fig. a, où elle eſt repréſentée de grandeur naturelle, ſur une coquille de Moule.

N°. 17. *Corallina confervoides gelatinoſa alba, geniculis craſſiuſculis pellucidis.* R. S. p. 34. N°. 7. Planche XI. Fig. b. B.

Coralline à Soye.

CETTE Coralline, qui eſt très belle, fine & tranſparente, eſt attachée aux pierres & aux autres productions qu'on trouve au fond de la Mer, par pluſieurs petits filaments tubuleux, & ſemblables à de la belle ſoye.

CES filaments forment par leur réünion la tige d'où partent pluſieurs ramifications longues & déliées, & qui s'élèvent en faiſant des zigzag, ou des angles de côté & d'autre. Du ſommet de ces angles ſortent d'autres petites branches qui ſe ſubdiviſent toûjours en deux autres. Le Microſcope y fait découvrir d'un côté une rangée de trous, dont chacun eſt environné d'un rebord. Ces trous ſont toûjours placés plus près les uns des autres, à meſure que les branches déviennent plus petites, ce qu'elles continuent de faire juſqu'à leur extrêmité. La Fig. *b.* N°. 17. met ſous les yeux cette Coralline, repréſentée exactement & dans toutes ſes proportions: On en voit une petite branche, groſſie au Microſcope en B., & les filaments

tubuleux qui ſont repréſentés adhérens à une pierre, Fig. *d.*, ſont groſſis au Microſcope en D.

Les Véſicules ſont faites en Ovale, & ouvertes par le haut; mais elles ſont ſi petites, ſi minces, & ſi délicates, qu'il eſt très difficile de les conſerver.

Je reçûs au mois de Septembre 1753. quelques Corallines de cette eſpèce, dans de l'eau ſalée: Elles étoient fraiches, & avoient été priſes près de l'Embouchure de *la Tamiſe*. Je découvris que chaque petit trou avoit une Véſicule, qui contenoit un Polype à huit bras. Voyez Fig. B. En examinant au Microſcope une branche de cette Coralline, que j'avois miſe dans le verre d'une montre, plein d'eau de Mer, je vis clairement que la partie intérieure & creuſe de la Coralline entière, étoit remplie de la ſubſtance du Polype principal: Elle paroiſſoit être tendre & gélatineuſe; & pour peu que les jeunes Polypes s'étendiſſent ou ſe contractaſſent, l'impreſſion ſe communiquoit viſiblement à cette ſubſtance délicate & charnue, à laquelle chacun de ces derniers étoit attaché par ſa partie inférieure, ou par ſa queuë.

La Fig. C. repréſente une partie d'une branche qui n'eſt pas encore développée; les bouts en ſont ronds, & les Polypes renfermés dans leurs Véſicules n'étoient pas encore parvenus à leur point de maturité. Ils étoient plus petits & plus ſerrés à meſure qu'ils approchoient des extrêmités des jeunes branches.

Le mouvement des inteſtins des jeunes Polypes fut toûjours très ſenſible, tant que l'eau ne ſe corrompit point; mais alors les Véſicules & les Polypes ſe ſéchèrent, tout comme les fleurs d'un Arbre qui ſont fanées. Quoique la ſubſtance du Polype principal parut remplir toute la cavité de la branche dont je viens de parler, cependant dès que l'eau ne pût plus la conſerver, elle devint ſur le champ ſi ridée, qu'elle n'étoit preſque plus viſible. N°. 18.

Digitized by Google

Plate XII



N°. 18. *Corallina procumbens caule corneo, longo, filiformi, articulato, Veſiculis, ramorum axillis, pedunculis contortis, inſidentibus.* Planche XII.

Fil de Mer.

Les tiges de cette Coralline ſont déliées, fléxibles, & ſouples comme du fil. Elles ont des Articulations environnées de petits Anneaux, d'où s'élèvent de petits pédicules tournés comme des vis, & qui ſoûtiennent des Véſicules de figure ovale, dont les unes ſont un peu ouvertes au ſommet, & les autres le ſont entièrement. Cette Coralline ſe trouve en grande quantité ſur les Côtes Sud-Oueſt de l'*Angleterre*, & comme ſes Articulations ſont formées d'une matière élaſtique, elle eſt par-là admirablement bien appropriée pour réſiſter à la violence des vagues. Ses Véſicules étant auſſi placées ſur des pédicules faits en forme de vis, cédent aiſement à l'effort des ondes, ſans en être endommagées.

Ces Corallines ſont repréſentées de grandeur naturelle. N°. 18. Fig. a.

La Fig. A. eſt la partie d'une branche, groſſie au Microſcope.

N°. 19. *Corallina minor repens, caule nodoſo, articulato, & Veſiculis alternis inſtructo.* Planche XII. Fig. *b.* B.

Coralline à Fils noüés.

Cette Coralline rampante, ſe trouve ordinairement adhérente au *Fucus* à Coſſes, d'où elle pouſſe des branches tendres & ondoyantes, de la longueur d'un pouce : Elles ſont garnies de petites Articulations qui paroiſſent noüées par le haut, & ſur leſquelles les Véſicules ſont placées en ordre alterne. Ces Véſicules, dont la figure reſſemble à celle d'u-

ne jarre à huile, avec un cou, ſont ſoûtenuës par des pédicules faits en forme de vis.

J'Ai lieu de croire que cette Coralline n'eſt pas rare le long de nos Côtes, puiſque celle dont il s'agit ici a été trouvée à *Douvres*, & qu'on m'en a envoyé dernièrement de *Harwich* quelques autres de la même eſpèce.

La Fig. b. N°. 19. a été deſſinée d'après une petite pièce du *Fucus* à Coſſes, chargée de pluſieurs de ces Corallines qui y croiſſent.

On en voit une petite branche, groſſie au Microſcope, Fig. B.

Je reçûs, au mois de Septembre 1753., quelques Corallines de cette eſpèce, toutes fraiches, & miſes dans de l'eau de Mer: J'y découvris, à l'aide du Microſcope, la forme & le mouvement du Polype qui en occupoit l'intérieur, & j'en pû ſuivre le corps principal dans toute l'étendue de la Coralline, qui étoit ondoyante. Le tout eſt repréſenté de grandeur naturelle Fig. *c.*, & groſſi au Microſcope Fig. C. J'eûs occaſion au mois de Juin de l'année ſuivante, pendant que j'étois à *Brightbelmſtone*, de voir cette même Coralline dans un état plus parfait; j'ai eu l'honneur d'en préſenter une deſcription à la Société Royale, & d'y joindre un très beau deſſein fait par Mr. *Ehret*.

Les Véſicules ſont faites en forme de gobelets, où les principales parties des Polypes ſe trouvent placées: Nous les avons vû déployant leurs griffes pour chercher leur proye: Nous avons remarqué en même-tems, qu'ils pouvoient mouvoir à leur gré leurs gobelets, avec leurs pédicules faits en manière de vis, & que ce mouvement ſe communiquoit à tout le tronc du Polype contenu dans l'intérieur de la tige,

Digitized by Google

Plate XIII.



ge, ou dans un étui fait d'une ſubſtance ſemblable à celle de la corne; car tous ces petits Polypes paroiſſent n'être qu'autant de bras du grand Polype, & ne faire qu'un tout avec lui.

N°. 20. *Corallina ramoſa, ramis ſingulis Equiſetiformibus, in ſummis Capillamentis contortis & verticillatim diſpoſitis, Veſiculas campaniformes gerens.* Planche XIII. Fig. a. A.

Prêle ou Coralline avec des gobelets, faits en forme de Cloche.

MONSIEUR *Brownrigg*, Médecin célébre & Membre de la Société Royale, trouva cette belle Coralline, ſur les Côtes près de *Whitehaven*, dans la Province de *Cumberland*: Vûe au Microſcope elle paroit avoir une ſtructure plus ſingulière qu'aucune de celles que nous avons déja décrites.

CETTE Coralline conſiſte en différentes branches, dont chacune eſt compoſée de pluſieurs petits tubes étroitement unis, & qui à de certaines diſtances égales pouſſent de petites tiges capillaires ſemblables à une Vis. Chacune d'elles ſoûtient un gobelet fait en forme de Cloche, & dont les bords ſont dentelés. Ces gobelets ſont tous placés & ſitués de la même manière, ce qui fait que toute cette Coralline reſſemble beaucoup à la Plante appellée *Equiſetum* ou Prêle. Les tiges capillaires ſont tournées comme un chandelier, ou comme les bras d'un luſtre.

LA Figure *a*, N°. 20., repréſente cette Coralline, telle que je l'ai reçûe.

ON voit Fig. A. une partie d'une des branches, groſſie au Microſcope; on y découvre cinq tubes qui compoſent la tige, & cinq pédicules à vis, garnis la pluspart de leurs gobelets placés à des hauteurs égales.

N°. 21.

Digitized by Google

Planche XIV. Fig. a. A.

N°. 21. *Corallina minima ſcandens, Veſiculas campaniformes in ſummo caule lineari contorto gerens.*

Petite Coralline grimpante, à gobelets en forme de Cloche.

CETTE Coralline, qui eſt d'une extrême petiteſſe, s'éleve ſur ces petits tubes irréguliers qui s'attachent aux autres Corallines, & ſur-tout à la Coralline à faucille, & qui s'entortillent autour d'elles.

CETTE tige tubuleuſe en pouſſe d'autres extrêmement petites & torſes, qui ſoûtiennent des gobelets à bords dentelés, & faits en forme de Cloche. Nous avons découvert, par le moyen du Microſcope, au fond de chaque gobelet, à l'endroit où il s'attache au pédicule, de très petits globules, ou petites bulles, telles que celles qui ſe voyent quelquefois dans des verres à boire. J'eûs le plaiſir à *Brightelmſtone*, au mois de Juin 1754., de voir les Polypes de cette Coralline, qui déployoient leurs griffes, & remuoient leurs tiges. On en voit un au haut de la Figure A., groſſi au Microſcope: Ils ſont repréſentés de grandeur naturelle, & adhérens à la Coralline à faucille. Fig. a, N°. 21.

CETTE ſorte de Polypes a une très grande affinité avec les Animaux à Cloche, adhérents à la Lentille d'eau, ou *Lenſpaluſtris*, décrite par Mr. *Lewenhoeck*, qui en a donné une Figure, dans les *Tranſactions Philoſophiques*, N°. 283. 295., & 337; Toute la différence qui s'y trouve, c'eſt que ceux dont nous parlons ſont beaucoup plus gros.

DANS le genre de cette Coralline rampante, ou Coralline à Cloche, il y en a une autre eſpèce qui eſt adhérente ſur le Sapin de Mer, & qui différe de celle que nous venons de décrire, en ce que celle-là a ſes pédicules tors beaucoup plus courts, & que ſes gobelets ſont d'une figure plus

Plate XIV.



Digitized by Google

plus allongée, & n'ont pas les bords dentelés. Elle eſt repréſentée de grandeur naturelle Fig. b, N°. 21. & groſſie au Microſcope. Fig. B.

N°. 22. *Corallina omnium minima, Veſiculis nunc ramoſim, nunc racematim, denſe diſpoſitis.* Planche XIII. Fig. *b.* B. *c.* C.

Coralline à Polypes en Bouquets.

De toutes les eſpèces de Corallines, celle-ci eſt la plus petite: Le quatrième Verre du Microſcope ſimple de *Wilſon*, ne la groſſit pas davantage qu'elle ne l'eſt dans les Figures B, & C. Elle eſt repréſentée de grandeur naturelle en b, 22. & en c, 22.

Pendant que j'étois occupé à examiner attentivement au Microſcope, quelques autres Productions Marines, je découvris un amas rond de Globules tranſparents, & attachés à la branche de l'une de ces Corallines; Voyez Fig. C. Je fus enſuite fort ſurpris de voir ces Globules ſe relever ſubitement, ſe déployer, & prendre la Figure d'une Plante, ſemblable à celle qui eſt repréſentée en B, avec des branches régulières, & des pédicules qui portoient des Véſicules faites en forme de poires. Chaque Véſicule, avec le Polype qu'elle contenoit, paroiſſoit ſe mouvoir indépendamment des autres; je remarquai que chaqu'un d'eux étoit fort occupé à chercher ſa proye, auſſi loin que la longueur de ſon pédicule le lui permettoit. Après avoir joui de ce ſpectacle, pendant un peu moins d'une minute, j'eûs un nouveau ſujet d'étonnement en voyant que tous ces Polypes, comme ſi on leur en eût donné le ſignal, & d'un commun conſentement, ſe repliérent tous à la fois, & prirent la figure d'une Meure, ou d'une grappe de Raiſins. Voyez Fig. C. Ils reſtérent pendant quelques ſecondes dans cet état, ils s'étendirent enſuite tout comme auparavant, & ce jeu alternatif d'expanſion &

de contraction dura pendant tout le tems que je les examinai.

CETTE eſpèce de Polype paroit reſſembler à ceux que Mr: *Trembley* a décrit, ſous le nom de Polypes en bouquets: Mais ceux-ci vivent dans l'eau douce, & ceux-là dans l'eau de Mer.

Planche XV. Fig. a. A. N°. 23. *Corallina exigua repens, denticulis alternis fructûs medicæ cochleatæ æmulis.*

Luzerne.

CETTE petite mais belle Coralline a été trouvée rampante ſur cette eſpèce de *Fucus* à feuilles étroites, que Mr. *Ray* nomme, *Fuci telam lineam ſericeamve textura ſua æmulantis altera ſpecies anguſtior.* R. S. pag. 43. N°. 10.

LES racines tubuleuſes irrégulières & rampantes, par leſquelles cette Coralline s'attache au *Fucus* dont nous venons de parler, pouſſent de petites pointes ou branches garnies de Denticules alternes très bien cannelées, & ſemblables aux Vaiſſeaux ſéminaux de la Luzerne.

LA Fig. *a*, N°. 23. repréſente cette Coralline de grandeur naturelle, & rampante ſur le *Fucus*, qu'on vient de nommer.

LA Fig. A, eſt une repréſentation des tubes rampants avec les Denticules, & une Véſicule groſſie au Microſcope. Ce ne fut qu'au mois de Juin de l'année 1754, pendant que j'étois à *Brighthelmſtone*, que je découvris les Véſicules de cette Coralline: juſqu'alors je les avois confondues avec les Denticules, dont elles différent très peu, & ſeulement par les trois dents placées à l'ouverture qu'elles ont chacune à leur ſommet. Cette Véſicule ſe voit, Fig. A.

N°. 24.

Digitized by Google

Plate XV



Digitized by Google

N°. 24. *Corallina exigua, caule geniculato, ſcandens, Veſiculis ex unoquoque geniculo ſic diſpoſitis, ut Syringam Panis referent.* Planche XV. Fig. *b.* B.

Fucoides Lendigerum capillamentis cuſcutæ inſtar implexis. R. S. pag. 30. N°. 3.

Coralline à Lentes.

CETTE Coralline, qui eſt extrêmement petite & grimpante, s'attache aux *Fucus*, & aux autres Productions Marines, par des tuyaux très menus, qui lui ſervent de racines: Telle eſt ſa ſtructure, qu'au moyen de ſes articulations, elle monte le long des autres Corallines & des *Fucus*, autour deſquels elle s'entortille, tout comme l'Epithyme fait autour des autres Plantes. Elle eſt repréſentée de grandeur naturelle, Fig. b. N°. 24.

SES Véſicules paroiſſent être des rangs de Denticules, & ſont placées à l'extrêmité de chaque jointure, dans un ordre ſi régulier, que groſſies au Microſcope, elles ont la figure de la flute du Dieu Pan. Voyez la Fig. B.

J'AI emprunté le nom de Lente, que je donne à cette Coralline, de Mr. *Ray*, qui l'appelle *Fucoides* qui porte des Lentes. On peut s'en faire une idée en jettant les yeux ſur la Fig. b, où elle eſt repréſentée de grandeur naturelle, & où l'on voit les Véſicules jointes étroitement entr'elles, en forme de petites taches, diſperſées parmi les branches capillaires & irrégulières.

N°. 25. *Corallina minima repens, Veſiculis ovatis, uvarum inſtar, ramulis adherentibus.* Planche XV. Fig. *c.* C.

Coralline à Raiſins.

CETTE Coralline, qui eſt très petite, rampe ſur ce *Fucus* à feuilles larges, que *Ray* nomme *Fucus telam lineam ſericeamve textura ſua æmulans*; R. S. pag. 42. N°. 9.

ELLE pouſſe des grappes de Véſicules en pluſieurs endroits de ſon tube: Chaque Véſicule a une tache noire ſemblable au frai des Grenouilles; ou plutôt, groſſies au Microſcope, elles paroiſſent être comme une grappe de Raiſins à figure ovale, tranſparants, & bien murs, avec leurs pepins au milieu. Voyez, Fig. C. La Coralline même eſt repréſentée de grandeur naturelle, & rampante ſur le *Fucus*, à feuilles larges; Fig. c. N°. 25.

COMME j'étois occupé, au mois de Septembre 1753, à examiner au Microſcope, pluſieurs Productions Marines que j'avois reçûes toutes fraiches, de la Mer, je fus fort ſurpris de voir que ces Raiſins étoient un amas de Polypes, armés chacun de huit griffes, qu'ils remuoient avec beaucoup de vivacité, pour attrapper leur proye. A meſure que ces petits Animaux mouroient, ils ſe contractoient au fond de leurs Véſicules qui ſe refermoient par le haut: ce que nous avions pris pour une tache, étoit les inteſtins du Polype, remplis encore de la nourriture qu'il avoit priſe.

LA Fig. D. repréſente ces Polypes s'étendant hors de leurs Véſicules, & groſſis au Microſcope: Ils ſont placés ſur la même branche, où l'on en voit d'autres en C, qui ſont morts, & qui ont la figure de Raiſins.

Planche XIV. Fig. c. C.

N°. 26. *Corallina cuſcutæ forma, minima, ramoſa, repens, ramulis oppoſitis, Veſiculis minutiſſimis ovatis confertis, geniculis ramulorum inſidentibus.*

Coralline rampante, en forme de Cuſcute.

EN examinant au Microſcope cette Coralline, qui eſt très déliée & rampante, on trouve qu'elle reſſemble à la Cuſcute; elle s'étend ſur le *Fucus* à Coſſes, d'où elle pouſſe des ramifications extrêmement déliées, & oppoſées les unes aux autres. ON

* Goute du Lin, Cuſcute.

Plate XVI.

On voit, Fig. c, N°. 26, la véritable forme de cette Coralline rampante ſur le *Fucus.*

Nous avons découvert, à l'aide du Microſcope, ſes Véſicules qui ſont petites, ovales, & qui pour la pluſpart croiſſent ſerrées l'une contre l'autre, aux jointures des branches.

La Fig. C. repréſente une branche groſſie au Microſcope.

CHAPITRE III.

Des Corallines *Tubuleuſes.*

J'apelle Corallines Tubuleuſes, ces Corallines qui conſiſtent en tubes ſimples, qui croiſſent appliqués les uns aux autres, ou celles qui étant garnies de branches, ne ſont compoſées que de tubes ſans Denticules ni Véſicules. La ſubſtance de celles-ci, eſt comme celle des précédentes, une eſpèce de corne élaſtique; & comme elles encore, elles reprennent leur première forme, lorſqu'on les met dans l'eau, après qu'elles ont été ſéches pendant quelque tems. Elles s'élèvent de même que celles de la claſſe précédente, hors de pluſieurs petits tubes Vermiculaires, qui vont en s'élargiſſant tant ſoit peu, à meſure qu'ils croiſſent en hauteur. Quelques-uns paroiſſent couverts de rides comme le conduit de la reſpiration, & les autres reſſemblent aux inteſtins de petits Animaux.

N°. 1. *Corallina tubularia laringi ſimilis.*
An Fucus Dealenſis fiſſuloſus laringi ſimilis? R. S. pag. 39. Planche XVI. Fig. *b.*
Coralline Tubuleuſe ridée comme la Trachée-Artère.

Cette Coralline, qui s'attache aux autres Corps Marins

& ſouvent à la quille des Vaiſſeaux, ſe trouve en grande quantité dans la mer, près de l'embouchure de *la Tamiſe*. Elle m'a été envoyée dans de l'eau de mer; ſes Animaux étoient vivans, & dans cet état elle préſente un ſpectacle très amuſant. On voit au ſommet de chaque tuyau un Polype d'un rouge cramoiſi auſſi éclatant que celui du Lis de *Guernſey*. Tous ces Animalcules étendoient leurs griffes en même-tems, & les remuoient avec une agilité ſurprenante.

QUELQUES-UNS de ces tubes ſont repréſentés de grandeur naturelle, Fig. *b*.

Planche XVI. Fig. c. N°. 2. *Corallina tubularia calamos avenaceos referens. Adianti aurei minimi facie planta marina.* R. S. p. 31.

Coralline Tubuleuſe, ſemblable aux tuyaux d'Avoine.

DE toutes les eſpèces de Corallines tubuleuſes que produit l'*Angleterre*, celle-ci eſt la plus grande; c'eſt la même que celle que Mr. *Juſſieu* a trouvée ſur les Côtes de *Normandie*, & dont il a donné une deſcription, de même que de ſes Polypes. Elle a pour baſe de petits corps Vermiculaires, dont pluſieurs s'entrelaſſant les uns dans les autres, reſſemblent aux inteſtins de petits Animaux: Elle pouſſe enſuite des tubes diſtincts, longs de cinq à ſix pouces, & remplis d'une liqueur épaiſſe & rougeâtre. C'eſt à leur ſommet que ſe trouvent les Polypes ornés de crêtes garnies de plumes. Ces tubes reſſemblent dans les Corallines ſéches, à des tuyaux d'Avoine, ou pour mieux dire, à des brins de paille d'Avoine, dont on a coupé les jointures.

LA Fig. c. eſt une repréſentation au naturel de cette Coralline, avec ſes Polypes.

N°. 3.

Digitized by Google

Plate XVII.



N°. 3. *Corallina tubularia gracilis & ramoſa, axillis ramulorum contortis.* Planche XVI. XVII. Fig. *a.*

An Fucus fiſtuloſus nudus, ſetas erinaceas æmulans? R. S. pag. 39. Planche XVII. Fig. A.

Coralline tubuleuſe à petites ramifications.

CETTE Coralline tubuleuſe & ramifiée, ſe trouve ſouvent ſur les Huitres, & ſur d'autres Productions Marines.

PENDANT que j'étois à *Whitſtable* ſur les Côtes de *Kent*, au mois d'Août 1754., je trouvai parmi pluſieurs autres Corallines, celle qui eſt décrite avec ſes Polypes vivans, Fig. *a.* Planche XVII. Je la deſſinai ſur le champ à l'aide du Microſcope. La Fig. A. en eſt une juſte repréſentation: On y voit tous ſes petits Animalcules qui s'étendent en différens ſens, & ſuivant les directions qu'ils prennent, lorſqu'on les met dans un verre plein d'eau de mer.

CET exemple nous fournit une démonſtration claire, que les belles Corallines à ramifications, décrites au commencement de cet Ouvrage, ſont fabriquées par les petits Animaux mêmes qui y logent. En partant de la Coralline qui fait le ſujet de cet article, & qui eſt la plus ſimple de toutes, nous pouvons ſuivre toutes les autres, à travers la varieté infinie de leurs formes, & remonter juſqu'à la plus parfaite de toute l'eſpèce.

REMARQUONS encore que le Polype de cette Coralline reſſemble beaucoup, par ſes ramifications, au Polype d'eau douce, décrit par Mr. *Trembley*. Mais la Nature deſtinant le premier à vivre dans un élément auſſi agité que la Mer, & auſſi peuplé d'ennemis de tout ordre, a pourvû à ſa conſervation, en le fixant par ſa baſe, ſur des Corps ſolides, & en lui donnant une envéloppe d'une matière dure & ſemblable à de la corne: Précautions inutiles pour l'autre Polype, qui, vivant dans les eaux tranquilles des étangs & des foſſés, ſe trouve par-là ſuffiſamment à couvert de tous ces accidents.

CHA-

CHAPITRE IV.

Des Corallines *Celluleuſes.*

LES Corallines Celluleuſes ſont des Corps Marins, ſemblables à de petites Plantes, qu'on trouve attachés ſur les coquillages, ſur les *Fucus*, &c. & formés d'une matière cruſtacée, caſſante & tranſparente: Ces Corallines groſſies au Microſcope paroiſſent-être des Cellules très minces, où logent de petits Animaux joints enſemble, & qui, par leur arrangement & par la variété de leurs formes, reſſemblent à des branches. Toutes les Corallines de cette eſpèce fermentent avec les Acides.

Planche XVIII. Fig. a. A.

N°. 1. *Corallina cellifera, erecta, ramoſiſſima, tenerrima, & plumoſa.*
Corallina pumila, erecta ramoſior. R. S. pag. 37. N°. 20.
Coralline à Duvet.

CETTE Coralline reſſemble ſi peu dans ſon origine à ce qu'elle eſt, lorſqu'elle eſt parvenuë à ſa perfection, qu'au premier coup d'œil on ſeroit tenté d'en faire deux eſpèces différentes.

ELLE eſt repréſentée, N°. 1. Fig. *a.* 2., telle qu'elle eſt dans ſa première origine, c'eſt-à-dire toute nuë, ſans duvet, & ſes Cellules fermées. C'eſt dans cet état qu'elle eſt décrite dans l'*Hortus Siccus* de *Buddle*, & dans la Collection de feu Mr. *Hans Sloane*, ſous le nom de *Fucus minimus, hirſutus fibrillis herbaceis ſimilis.* D. Doody. R. S. pag. 330.

MAIS lorſque la Coralline eſt parvenuë à ſa perfection, ces tiges tubuleuſes s'élèvent en forme de belles plantes à branches, garnies de Duvet, & très bien arrangées l'une au deſſus de l'autre,

Plate XVIII.



Digitized by Google

tre, comme on le voit Figure *a*, N°. 1. Ces branches vuës au Microſcope paroiſſent être ſubdiviſées en deux, & chaque diviſion eſt compoſée de deux rangs de Cellules demi-cylindriques, jointes enſemble par des articulations & appliquées alternativement, les unes aux autres par leurs côtés, avec leurs bouches ou leurs ouvertures toutes tournées du même ſens: Chaque Cellule a à ſon ſommet une pointe aigue, ſaillante, & une tache noire au milieu. J'ai vû d'autres Corallines dont les Cellules étoient ſurmontées par de petits globules teſtacés.

La Fig. A. eſt une repréſentation des petits tubes groſſis au Microſcope, & pénétrans dans les Celſules fermées, dont la tige eſt compoſée: cette tige en s'élevant ſe partage en branches fourchues, & garnies de Cellules ouvertes, dans leſquelles ſe trouvent ces taches noires dont on vient de parler. On voit en B. les globules teſtacés qui ſont au ſommet de chaque Cellule. Pour mettre ſous les yeux l'intérieur creux des Cellules, on a repréſenté en C, une branche coupée tranſverſalement. D, repréſente la ſection perpendiculaire de trois Cellules, & la ſituation des taches noires qui y ſont contenues.

Ces taches ne ſont que les Polypes morts, ou les reſtes des Animalcules auxquels ces Cellules ont ſervi de demeure. C'eſt ce dont je fus bien convaincu dans le dernier Voyage, que je fis ſur nos Côtes: car ayant examiné cette Coralline, avec ſes Polypes vivans, dans de l'eau de Mer, tels qu'ils ſont repréſentés en E., j'y trouvai, quelque-tems après, ces petits Animaux contractés & ſans vie, & ſous la forme de ces taches noires dont il s'agit ici.

Le changement de ces Polypes, qui ſe métamorphoſent en Corps teſtacés, m'ouvrit une nouvelle ſcène de merveilles, que je n'aurois pas même apperçuës, à cauſe de la petiteſſe de ces Coquillages, ſans un préſent que je reçûs de quelques

Corallines de cette eſpèce, qui me furent envoyées d'*Amérique*, par Mr. *Collinſon*, Membre de la Société Royale. En les examinant ſoigneuſement au Microſcope, je vis clairement qu'elles n'étoient que les nids joints enſemble, ou les Matrices de certains Animaux teſtacés, ſemblables à des Limaçons, ou à des Nérites.

J'EUS l'honneur au mois de Mars de l'année 1753, d'en préſenter une deſcription à la Société Royale. Si on prend la peine d'examiner ces petits Limaçons, on ne pourra pas douter qu'ils ne ſoient des Animaux parfaits, & que cette belle Coralline branchue, ne ſoit principalement deſtinée à ſervir de logement à ces petites Créatures. J'avouë qu'il eſt difficile de conçevoir, de qu'elle manière elles perpétuent leur eſpèce: On peut cependant ſuppoſer par analogie que ces petits Animaux groſſiſſent, & acquièrent la faculté de répandre leur frai, par toute la Coralline, de la même manière que le *Buccinum* de la *Nouvelle-Tork*, le fait dans ſes Matrices, qui reſſemblent à de longues touffes de Houblon. Voyez. Planche XXXIII. Fig. a, a 1, & b.

ON peut encore ſuppoſer, que l'Animal teſtacé parvenu à ſa perfection, dépoſe ſes Oeufs; que ceux-ci ſe changent en Polypes Vermiculaires, qui après s'être fixés eux-mêmes ſur quelque Production Marine, s'élèvent & pouſſent des branches de petits Polypes contenus dans leurs Cellules, en double rangs, & placées alternativement l'une par rapport à l'autre; & qu'enfin chaque petit Polype a ſa Cellule propre, & ſeparée de celles des autres, par une cloiſon très mince, & qu'il eſt affermi par un ligament umbilical.

C'EST en obſervant les petits Polypes dans cet état, que nous avons remarqué qu'ils ſe changent en Animalcules teſtacés, & attachés à leurs Cellules par un ligament umbilical, juſqu'à-ce qu'ils puiſſent pourvoir eux-mêmes à leur ſubſiſtance.

COM-

Plate XIX.

Digitized by Google

BIBLIOTECA NACIONAL

Digitized by Google

Plate XX.

COMME nous n'avons pas eu ſouvent occaſion de les examiner près des Côtes, nous n'avons pas pu diſtinguer ſi ce ligament dépend du Polype principal, comme cela a lieu dans la Coralline Véſiculeuſe. Voyez Planche V. Fig. A. où les jeunes Polypes tiennent enſemble par un filet tendre & charnu, qui paſſe par le milieu des branches.

N°. 2. *Corallina cellifera erecta, ramoſa & plumoſa, ſphærulas teſtaceas, ſumma parte, aviumque capitum formas, a latere Cellularum, gerens.* Planche XX. Fig a. A.

Coralline à tête d'Oiſeau.

CETTE belle Coralline Celluleuſe s'élève ſur de petits tubes, qui forment en s'uniſſant des branches de Cellules demi-cylindriques, placées en deux rangs, & garnies d'Articulations qui entrent les unes dans les autres. Elles ont toutes leur ouverture tournée du même côté. En examinant ces Cellules au Microſcope, nous découvrimes que chacune d'elles avoit, au dehors, la figure d'une tête d'Oiſeau à bec crochu, & fort ouvert, dont nous ignorons encore l'uſage, parceque nous n'avons pas encore vû cette eſpèce de Coralline fraiche, dans l'Elément qui lui eſt propre.

LES Globules, ou petites figures teſtacées, ſont preſque les mêmes que celles de l'eſpèce précédente. Cette Coralline eſt caſſante comme du Verre.

ELLE eſt repréſentée en a, telle qu'on la trouve communément. Celle qui nous a ſervi de modèle nous fut envoyée parmi pluſieurs autres Productions Marines, trouvées à la rade de *Dublin.*

LA Fig. A, repréſente une branche avec ſes petits tuyaux, ſes Cellules & ſes autres parties, groſſies au Microſcope.

Planche XX. Fig. b. B.

N°. 3. *Corallina cellifera minor, repens, ramosa, tubulis lævibus, interdum hamosis, sparsim dispositis, fucis testisque alligata.*

Muscus Coralloides pumilus, ramosus. Dood. Appendix, R. S. pag. 330.

Coralline rampante.

De toutes les espèces de Corallines Celluleuses, celle-ci est la plus commune; elle s'attache à la plûpart des Corps qu'on trouve au fond de la Mer.

Les branches se partagent constamment en deux, à mesure qu'elles s'étendent: Les Cellules ressemblent à des cones renversés; leurs ouvertures sont rondes, toutes tournées du même sens, & pour l'ordinaire défenduës par de petites épines. Les Cellules s'élèvent en deux rangs joints entr'eux, de manière qu'elles sont alternativement opposées les unes aux autres.

Cette Coralline est représentée, grossie au Microscope, Fig. B. Ses Cellules étoient pleines de taches noires, qui, comme je l'ai déja remarqué, ne sont autre chose que des Polypes morts. D'autres Corallines avoient au sommet de chacune de leurs Cellules, de petits Globules testacés.

Les jointures placées aux angles des ramifications, & qui sont représentées, grossies au Microscope, en E, tiennent l'une à l'autre par quelques tuyaux souples & courts, qui servent aux branches, comme autant de pivots, pour pouvoir se plier librement en tous sens, & cèder à la violence des Ondes. Ces pivots paroissent consister en deux tubes courts, un à chaque rang de Cellules; ils sont si parfaitement joints aux branches, qu'ils semblent se perdre insensiblement dans les Cellules de chacune de ces branches.

Cette Coralline différe de la plûpart des autres dans la situa-

ſituation de ſes racines tubuleuſes, qui paroiſſent ſortir, comme dans les Plantes qui rampent, de différens côtés de leurs ramifications trainantes. Lorſqu'on examine au Microſcope ces petits tubes radicaux, on en trouve quelques-uns qui ſont remplis de crochets, pour affermir d'autant mieux la Coralline, lorſqu'elle s'attache à des Corps mous & ſpongieux. Les crochets de l'un de ces tubes ſont repréſentés, Fig. F., & la Coralline ſe voit de grandeur naturelle, Fig. b, N°. 3.

CETTE Coralline miſe dans du Vinaigre fermente avec beaucoup de violence, juſqu'à-ce que l'enveloppe pierreuſe, ou ſemblable au Corail, ſoit entiérement diſſoute; les Cellules, qui conſervent encore leur figure, paroiſſent alors faites d'une membrane mince & pliable, telle que celle des pivots & des racines: de-ſorte que les racines, les pivots & les Cellules ſemblent n'être que la continuation d'une ſeule & même membrane tubuleuſe, mais modifiée en différentes formes.

N°. 4. *Corallina cellifera minor, repens, ramoſa, & ſcrupoſa, Cellulis alternis a latere angulatis.* Planche XX. Fig. *c.* C.

Coralline pierreuſe rampante.

CETTE Coralline diffère de la précédente, en ce que ſes Cellules ont des côtés angulaires, & que la matière dont elle eſt compoſée eſt plus pierreuſe, & plus caſſante.

J'OBSERVAI à *Ramsgate*, au mois d'Août 1754., les Polypes dans leurs Cellules, tels qu'ils ſont repréſentés Fig. C., où l'on voit groſſie au Microſcope une branche de la Coralline, deſſinée de grandeur naturelle, Fig. c. N°. 4.

N°. 5. *Corallina cellifera minima, erecta, ramoſa, Cellulis infundibuli-formibus, baſi conjunctis, oribus patentiſſimis, ſuperne ciliatis, & alternatim prominentibus.* Planche XX. Fig. *d.* D.

Coralline à Cils.

CETTE Coralline, qui eſt très petite, a pour racines pluſieurs petits tubes qui ſe réüniſſent, & pouſſent des branches compoſées de Cellules, qui ont la figure d'un entonnoir, & qui, placées dans un ordre alterne, s'uniſſent étroitement de côté par le bas. Leur ouverture eſt fort large; & la partie ſupérieure, qui eſt plus ſaillante, eſt garnie de petits poils ſemblables aux cils des Paupières. Leurs baſes ſont étroites, & ſemblent être articulées, & ſi on les examine avec attention, on y découvre de petits cheveux blancs, qui paroiſſent traverſer le milieu de chaque branche, là où les Cellules ſe joignent. On voit au haut de ces Cellules, de petits Corps teſtacés, qui reſſemblent en quelque manière au ſommet d'un caſque. Quelques-unes ont ſur les côtés de petites figures ſemblables à des têtes d'oiſeaux, telles, à peu-près, que celles dont j'ai parlé en décrivant la ſeconde Coralline Celluleuſe.

CETTE Coralline, qui eſt repréſentée groſſie au Microſcope Fig. D., & de grandeur naturelle en d. N°. 5., eſt la plus tendre, & la plus délicate de toutes celles de cette eſpèce.

Planche XXI. Fig. a. A.

N°. 6. *Corallina cellifera minima, fragilis, ramoſa, & Veſiculifera, colore eburneo, Cellulis tubiformibus conjunctis, paulum arcuatis, & fere oppoſitis.*

Coralline à touffe, couleur d'yvoire.

IL paroit que cette Coralline bien examinée au Microſcope, a pour baſe de petits globules comprimés, & dépoſés ſur un *Fucus*. On découvre, au centre de chacun de ces globules, un petit trou, d'où s'élèvent des tubes fort déliés, qui forment enſuite des branches garnies d'un double rang de Cellules tubuleuſes, preſque oppoſées l'une à l'autre, & jointes enſemble de côté, mais un peu ſéparées à leur ſommet. Ces branches pouſſent latéralement çà & là, de petites Véſicules creuſes, fort fragiles, & remplies de petites taches. Nous avons

Plate XXI



Digitized by Google

avons découvert un petit tuyau joint à l'un des côtés de ces Véſicules, & qui ſans doute leur tient lieu d'ouverture. La Coralline, dont nous parlons, a une grande affinité avec la claſſe des Corallines Véſiculeuſes; car en ayant examiné dernièrement, ſur les Côtes, quelques-unes de cette eſpèce, nous y avons trouvé des Polypes morts dans leurs Véſicules: Cependant comme elles ſont d'une nature pierreuſe & caſſante, que leurs Cellules ſont marquées de taches noires, & que leurs branches ſont jointes par de petits pivots tubuleux, nous avons crû pour toutes ces raiſons devoir les rapporter ici.

La Fig. a. N°. 6. repréſente cette Coralline au naturel, & croiſſant ſur un morceau de *Fucus.*

On en voit une branche groſſie au Microſcope, Fig. A, & s'élevant de deſſus le *Fucus.*

N°. 7. *Corallina cellifera mollis ramoſiſſima, geniculis ad loricæ formam accedentibus.* Planche XXI. Fig. *b.* B.

Muſcus Coralloides mollis, elatior, ramoſiſſimus, App. R. S. pag. 330.

Corallina geniculata mollis, internodiis rotundis brevioribus noſtras, Pluck. Mant. 56.

Coralline à Cotte de maille.

Cette Coralline, qui pouſſe des ramifications plus touffues que les autres, conſiſte en pluſieurs branches longues, brillantes, molles, gliſſantes, & formées de Cellules articulées, placées par paires, & adoſſées l'une contre l'autre. Les ouvertures de chaque Cellule ſont obliques, près du ſommet, & tournées dans un ſens oppoſé, de ſorte que la paire entière a la figure d'une Cotte de maille, ou d'un Corps de juppe; les ouvertures de celui-ci, pour paſſer les bras, reſſemblent à l'entrée des Cellules. Les Articulations, ou les doubles Cel-

Cellules ſortent inſenſiblement des petits tuyaux par leſquels la Coralline s'attache à ſa baſe; & dans certaines ſaiſons de l'année, on trouve dans les Cellules, de petites taches noires ſemblables à celles des autres Corallines de cette Claſſe.

CETTE Coralline eſt fort abondante le long des Côtes de l'Iſle de *Sheppey*; on la trouve ſouvent rampante ſur la Coralline à ſoye, dont on a parlé plus haut, & s'entortillant autour d'elle.

LA Fig. b, N°. 7. repréſente cette Coralline au naturel; celle qu'on vient de décrire n'eſt qu'une petite partie de la Coralline même, telle qu'on la trouve ordinairement.

LA Fig. B, eſt le deſſein fait au Microſcope d'une petite branche, qui ſort des petits tubes.

Planche XXII. Fig. A. *a*.

N°. 8. *Corallina cellifera minima, ramoſa, Cellulis compreſſis, oppoſitis, ſiliculæ burſæ paſtoris formam æmulans.*
Bourſe à Berger.

CETTE Coralline, d'un beau gris de Perle, s'attache aux *Fucus* par de petits tubes: Elle pouſſe enſuite des Cellules plates, larges par le haut, étroites par le bas, & ſemblables aux gouſſets d'une tablette. Ces Cellules ſont placées dos-à-dos, & par paires, l'une au deſſus de l'autre, & ſont ſoûtenuës par un tube fort délié, qui ſemble paſſer par le milieu de toutes les branches de la Coralline.

LES Cellules ſont ouvertes à leurs ſommets: quelques-unes ſont marquées de taches noires. On voit ſortir du haut, de pluſieurs de ces Cellules, une figure ſemblable à une courte pipe, qui paroit être attachée par ſon petit bout, au tube qui traverſe toute la Coralline.

SUIVANT quelques-uns la paire de ces Cellules a quelque reſſemblance aux Coſſes de cette eſpèce de Creſſon, que l'on appel-

Digitized by Google

Plate XXII



Digitized by Google

appelle *Burſa Paſtoris ;* mais d'autres trouvent qu'elle a la figure des Vaiſſeaux ſéminaux de la Véronique.

La Fig. a, N°. 8. repréſente quelques branches de grandeur naturelle, & rampantes ſur la tige d'un *Fucus.*

On voit Fig. A. une branche avec ſes petits tubes, groſſie par le cinquième Verre du Microſcope ſimple de *Wilſon.*

N°. 9. *Corallina cellifera minutiſſima; ramoſa, & falcata, Cellulis ſimplicibus, Tauri cornu facie invicem inſertis.* Planche XXII. Fig. b. B.

Coralline à Cornes de Taureau.

C'est ici une des plus petites Corallines qu'on trouve: Elle s'élève hors de petits tuyaux qui croiſſent ſur le *Fucus*, & forme enſuite des branches faites en faucilles, & compoſées d'un ſimple rang de Cellules, qui, groſſies au Microſcope, reſſemblent aux cornes renverſées d'un Taureau. Ces Cellules ſont placées au ſommet l'une de l'autre. Les branches d'en haut croiſſent ſur la partie antérieure de l'entrée de la Cellule, où l'on voit un cheveu court & roide, qui paroit être le commencement d'une autre branche. Les ouvertures ſont placées ſur le devant de la partie ſupérieure de chaque Cellule, & environnées d'un bord mince & circulaire: Ces Cellules ſont faites d'une ſubſtance, qui paroit être celle d'une belle écaille tranſparente, ou reſſemblante au Corail.

La Fig. b. N°. 9. repréſente cette petite Coralline, de grandeur naturelle, & adhérente à un *Fucus.*

On voit en B, les tubes & les ramifications des Cellules, faites en forme de faucilles, & groſſies par le cinquième verre du Microſcope de *Wilſon.*

N. 10. *Corallina cellifera, minutiſſima, falcata, & cruſtata, Cellulis Capricorniformibus ſimplicibus, Veſiculas gerens.* Planche XXI. Fig. c. C.

Coralline à Cornes de Chèvre.

CETTE Coralline capillaire conſiſte en branches, qui n'ont qu'un ſeul rang de Cellules, faites comme les cornes renverſées d'une Chèvre, & placées l'une au deſſus de l'autre. Chaque Cellule a à ſon ſommet une petite ouverture circulaire, tournée en dedans, & ſur le dos de laquelle s'élève un cheveu droit, placé près de l'endroit où la Cellule ſupérieure s'inſére dans celle qui eſt au deſſous.

CETTE Coralline a des Véſicules de figure ovale, & marquées de taches ou de points, comme la Coralline Celluleuſe décrite N°. 6., & un petit tube au dos.

ELLE eſt repréſentée au naturel, Fig. c. N°. 10, & adhérente à un *Fucus*.

LA Fig. C. met ſous les yeux la Coralline entière, avec ſes Véſicules, & ſes tubes articulés, le tout groſſi par le cinquième Verre du Microſcope de *Wilſon*.

LES Véſicules de cette Coralline lui donnent une grande affinité, avec la ſixième de cette Claſſe. Il n'y a de différence qu'en ce que celle dont il s'agit ici, n'a qu'un ſeul rang de Cellules, d'où l'on voit ſortir de petits cheveux, au lieu qu'elles ſont diſtribuées par paires dans l'autre Coralline.

Planche XXII. Fig. *c.* C.

N°. 11. *Corallina anguiformis minutiſſima, non ramoſa.* Coralline à forme de Serpent.

LA forme de cette Coralline eſt ſingulière : Elle ſort d'un Tube irrégulier, qu'on trouve rampant ſur le *Fucoides purpureum eleganter plumoſum*, R. S. pag. 38.

CE Tube irrégulier, & qui va en ſerpentant, a dans ſa partie la plus large, de très petits trous, d'où l'on voit ſortir çà & là de petites figures teſtacées, blanches, creuſes, & parfaitement reſſemblantes à un ſerpent ſans machoire inférieure; l'ouverture des Cellules en tient la place.

LA

La Fig. *c*, N°. 11. repréſente cette Coralline de grandeur naturelle, & environnant la tige du *Fucus.* Mais on la voit en C, groſſie par le quatrième Verre du Microſcope de *Wilſon.*

Le Corps entier de la Cellule à forme de Serpent, & groſſi par le ſecond Verre du Microſcope de *Wilſon*, ſe voit Fig. D. Il paroit avoir une Articulation au milieu, & être fait d'Anneaux parallèles entr'eux.

CHAPITRE V.

Des Corallines *Articulées.*

Les Corallines, que nous avons décrites dans les Chapitres précédents, tirent leur origine d'un ou de pluſieurs tuyaux, creux, flexibles, & formés d'une ſubſtance qui tient de la nature de la corne : Après s'être élevées uniformément, elle ſe terminent en branches qui conſiſtent ou en tubes ſimples, ou garnis de Denticules ou de Véſicules, ou des unes & des autres en même temps, ou de rangs de Cellules jointes enſemble; c'eſt-à-dire que ces Corallines conviennnent entr'elles à de certains égards, & différent à d'autres. La même remarque a lieu par rapport aux Corallines Articulées: Quoique leurs formes extérieures & leur ſtructure ſoient différentes, cependant elles ſont deſtinées, comme toutes les autres eſpèces de Corallines, à la même fin & aux mêmes uſages, je veux dire à ſervir de demeure à différentes ſortes de Polypes.

En examinant avec attention cette Coralline au Microſcope, on voit qu'elle conſiſte en petits morceaux d'une matière pierreuſe, ou crétacée & caſſante, dont la ſurface eſt couverte de pores ou de Cellules. Ces morceaux pierreux, ou ces

Articulations ſont unies l'une à l'autre par une membrane rude & pliante, faite d'une infinité de petits tubes de la même nature, & joints étroitement enſemble.

Le Vinaigre diſſout en peu de tems la partie pierreuſe ou crétacée, & laiſſe en entier l'autre partie, qui non ſeulement forme les ligaments dont ſont compoſées les Articulations pliantes, mais qui ſert encore de fondement aux Cellules des Articulations pierreuſes.

Planche XXIII. Fig. a. A.

N°. 1. *Corallina articulata dichotoma, internodiis ſubcylindricis, cellulis rhomboideis, omnino tectis, & tubulis membranaceis exiguis, colligatis.*

Corallina fiſtuloſa fragilis craſſior. J. B. 3. 811. R. Hiſt. 65.

Muſcus coralloides polygonoides ſalicorniæ folio major. Bar. Ic. 1275. N°. 7.

Corallina fiſtuloſa fragilis, internodiis prælongis lævibus, albis, farciminum modo catenatis. Pluck. Phytog. Pl. XXVI. Fig. 2.

Bugle Coralline, ou Conſoude moyenne.

Il y a deux ſortes de Corallines de cette eſpèce, l'une qui eſt plus petite que celle dont il s'agit ici, & qui n'en différe que par le diamétre de ſes branches, eſt appellée par les Botaniſtes de ces deux noms.

Corallina fiſtuloſa, fragilis ſubtilior. J. B. 3. 811. R. Hiſt. 66.

Muſcus polygonoides ſalicorniæ folio minor, ſeu bifidus. Bar. Icon. 1275. N°. 8.

Cette belle Coralline pierreuſe ſort de pluſieurs tubes tranſparens & membraneux, dont elle eſt compoſée, & qui forment des Articulations cylindriques. Ces Articulations conſiſtent en Cellules pierreuſes, faites en loſanges, qui ont chacune une ouverture, & qui couvrent toute la ſurface de la Coralline.

La

Plate XXIII.



Digitized by Google

Digitized by Google

La grande Coralline Bugle eſt repréſentée de grandeur naturelle, Fig. a., N°. 1.

On en voit une branche Fig. A., groſſie au Microſcope, pour rendre ſenſible la forme extérieure des tubes, des Articulations, & des Cellules. B, eſt un morceau d'une des Articulations plus groſſie, & qui a été expoſée à l'air : On y voit clairement la forme de l'ouverture des Cellules. C, eſt une Section tranſverſale de ce même morceau, & met ſous les yeux la figure intérieure, & la diſpoſition des Cellules.

Les Articulations de la Coralline, ſe partagent conſtamment en deux, & ſont unies l'une à l'autre par de courts tubes, de la même nature que ceux dont ils ont pris leur origine.

Ces tubes ſont extrêmement pliants dans l'eau; & c'eſt ce qui fait qu'ils cédent ſi aiſément & ſans ſe caſſer, à toutes les agitations de la Mer.

Les Cellules ne ſont pas toûjours faites en loſanges: Quelquefois elles ſont voutées au ſommet, comme en D. Elles ont d'autrefois la figure d'un Cerceuil, comme quelques-unes des Cellules ſupérieures repréſentées en B.

Lorsque cette Coralline a été expoſée pendant quelque-tems ſur le rivage, elle devient blanche & fort dure; la ſéparation des Cellules devient auſſi plus mince, & plus viſible, comme on le voit Fig. B.

Quoique les Corallines d'écrites dans les Articles ſuivants, différent en grandeur, dans la forme de leurs Cellules, dans leurs racines tubuleuſes, & à quelques autres égards, cependant comme la définition générale de cette eſpèce de Coralline leur convient à toutes, & qu'elles paroiſſent ſe ſuivre dans l'ordre de la Nature, j'ai cru devoir les rapporter toutes à une ſeule & même Claſſe. Je dois auſſi

avertir que pour pouvoir mieux appercevoir les pores ou les Cellules des Corallines de cette Claſſe, il faut les examiner immédiatement aprés qu'on les a tirées de la Mer, parceque ſi on tarde plus long-tems, elles ſe ſéchent, la matière crétacée ſe reſſerre, & joint tellement les pores de la ſurface, qu'on ne peut plus diſtinguer celle-ci d'avec une ſuperficie polie, à moins que de ſe ſervir des plus forts Microſcopes.

Planche XXIV. Fig a. A.

N°. 2. *Corallina Anglica.* R. S. pag. 33. N°. 1.
Corallina alba officinarum. Park. 1298.
Coralline commune.

CETTE Coralline eſt adhérente aux rochers & aux coquilles, par des jointures pierreuſes, qui, à meſure qu'elles s'élèvent, s'uniſſent à d'autres par des tubes extrêmement déliés, & qu'on peut appercevoir avec un Microſcope ordinaire, & même à l'œil ſimple, lorſqu'on a la vûe bonne. Les tiges en s'étendant, pouſſent des deux côtés des branches oppoſées les unes aux autres, qui les font reſſembler à des panaches, & qui ſont articulées de la même manière. Les jointures de cette eſpèce reſſemblent à la partie ſupérieure d'un cone renverſé, mais un peu applati. Toute la ſurface eſt couverte de très petites Cellules rondes, & ſemblables à des pores. Voyez les Figures B. & B. 1., où elles ſont repréſentées groſſies par le plus fort Microſcope, de même que la Section tranſverſale, en B. 2.

LA Fig. a, N°. 2. eſt une repréſentation de cette Coralline, telle qu'elle fut trouvée croiſſant ſur un rocher.

SI l'on met une branche de cette Coralline dans du Vinaigre, ſes Cellules, & toute la ſurface crétacée ſont bien-tôt diſſoutes, & laiſſent à découvert des rangées de ramifications déliées, qui paroiſſent avoir eu une communication avec chacune de ces Cellules. Voyez Fig. A.

ON

Plate XXIV.



BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI

Digitized by Google

On apperçoit ſur quelques unes de ces Corallines de petites figures, ſemblables à ces Vaiſſeaux ſéminaux, qu'on voit ſouvent aux extrêmités des branches: on en trouve auſſi qui ſont placées ſur les côtés. La Fig. A. les repréſente groſſies au Microſcope.

Le Vinaigre dans lequel on trempa ces branches, les rendit toutes molles, & fit ſortir des boutons qui ſe trouvent aux bouts, & ſur les côtés de ces branches, de petites figures faites en forme de vis. Elles ſont groſſies au Microſcope en A. 1, mais on les a repréſentées en A. 2, en employant des Verres qui groſſiſſoient davantage.

Ces Corallines ſont ſouvent de différentes couleurs: Il y en a de rouges, de vertes, de cendrées, & de blanches; mais elles ont toutes ceci de commun, c'eſt que ſi on les laiſſe longtems ſur le rivage expoſées au Soleil & à l'air, elles deviennent blanches.

N°. 3. *Corallina Anglica procumbens, ſegmentis brevibus.* Planche XXIV. Fig. N°. 3.
Coralline Angloiſe déliée & trainante.

Cette Coralline ſemble n'être qu'une varieté de la première qui pouſſe des jets roides, droits, & à grandes Articulations, au lieu que les branches de celle-ci ſont pendantes & fort déliées, & n'ont que de petites Articulations. Voyez N°. 3. Sa couleur paroit varier, ſuivant la ſituation dans laquelle on la trouve.

N°. 4. *Corallina Anglica erecta, ramulis denſe pennatis, lanceolæ formâ terminantibus, ſegmentis ad utrumque latus paululum compreſſis.* Planche XXIV. Fig. c. C.
Corallina ſquammata: Parkin. 1296.
Coralline Angloiſe droite, à têtes en forme de lance, & à Articulations plates.

J'ai reçu cette Coralline de *Ludgvan*, dans la Province de *Cor-*

Cornouaille. Elle m'a été envoyée par Mr. *Guillaume Borlaſe*, Membre de la Société Royale, qui a eu la bonté de me procurer pluſieurs autres Productions Marines.

Elle eſt ordinairement d'un verd pâle; couleur qu'on doit peut-être attribuer au grand nombre de mines de cuivre qui ſont ſur les Côtes de *Cornouaille*, tout comme la terre ochreuſe, près de *Harwich*, donne à quelques Corallines, de la ſeconde eſpèce, une couleur d'Orange. La Fig. N°. 4. repréſente cette Coralline dans ſa forme naturelle.

On a repréſenté Fig. C. une branche groſſie au Microſcope, afin de faire voir la forme des Articulations. La matière crétacée avoit été diſſoute dans du Vinaigre. On découvre ſur chaque jointure différentes ſuites de ramifications, qui conduiſent aux Cellules de la ſurface. C'eſt ce que nous ferons voir pleinement dans la ſuite, par des exemples que nous fourniront quelques Productions Marines, qui nous ont été envoyées des Pays étrangers, & qui ſont de la même nature que celles-ci.

Planche XXIV. Fig. e. E.

N°. 5. *Corallina ramulis dichotomis, teneris, capillaribus, & rubentibus.*

Corallina rubens, ſive Muſcus marinus rubens. Park. 1296. Coralline rouge ſemblable à des Cheveux.

Cette Coralline groſſie au Microſcope paroit pouſſer des branches, qui ſe partagent toûjours en deux, & qui conſiſtent en Articulations longues & cylindriques, & unies par de très petits tubes. On peut voir aiſément, lorſque le Vinaigre en a diſſout la partie pierreuſe, les fines ramifications fibreuſes, qui répondent aux petits pores qui ſe trouvent ſur la ſurface de cette Coralline, comme ſur celle de l'article précédent.

Elle eſt repréſentée de grandeur naturelle N°. 5. Fig. *e.* La Fig. E. eſt une branche de cette Coralline groſſie au Microſcope.

N°. 6.

N°. 6. *Corallina alba exigua, ramulis dichotomis, ſegmentis corniculatis, fucis minimis teretibus adnaſcens.* Planche XXIV. Fig. *d.* D.

Coralline blanche à Articulations déliées.

CETTE Coralline différe de la précédente, en ce que ſes branches ſont plus fortes, & plus épaiſſes, & que le ſommet des Articulations inférieures, eſt diverſifié par deux pointes ſaillantes, & ſemblables à des cornes.

LA Fig. d. repréſente une touffe de cette Coralline croiſſant ſur un *Fucus.*

ON voit en D. la manière dont elle croit, de même que les Articulations inférieures en forme de cornes.

N°. 7. *Corallina dichotoma, capillis denſis, criſtatis, ſpermophoris, fucis minimis teretibus adnaſcens.* Planche XXIV. Fig. *f.* F.

Corallina criſtata minima. Barrell. pag. 1328.

Muſcus coralloïdes criſtatus. Bar. Icon. 1296. N°. 2.

Coralline à crête de Coq.

LES branches de cette Coralline, de même que celles des précédentes, ſe partagent par paires, ou de deux en deux; elle pouſſe des touffes rondes ſemblables à la crête ou à la houppe qu'on voit ſur la tête de quelques Oiſeaux, & compoſées d'un certain nombre de branches deployées en guiſe d'éventail, & couchées de plat l'une ſur l'autre. Il y en a qui ſont d'un très beau rouge, les autres ſont vertes avec un bord blanc.

CETTE Coralline croit ordinairement ſur un *Fucus* rond & délié. Le Microſcope fait découvrir ſur la partie ſupérieure des branches, quelques petites Véſicules, du ſommet desquelles on voit ſortir deux autres branches, qui commencent à pouſſer. Il ſemble donc que ces Véſicules ſoient deſtinées à ſervir d'appui & de ſoûtien à la Coralline.

ELLE eſt repreſentée de grandeur naturelle Fig. f. N°. 7.

LA Fig. F. eſt une branche groſſie au Microſcope, avec ſes Véſicules.

Planche XXIV. Fig. g. G.

N°. 8. *Corallina alba ſpermophoros, capillis tenuiſſimis. Corallina muſcoſa, ſeu Muſcus Marinus tenui capillo ſpermophoros.* Mor. Hiſt. Ox. Part. III. pag. 651. S. 15. T. IX. f. 9.
Coralline à Semence.

EN examinant au Microſcope cette Coralline, qui eſt blanche & très déliée, on y découvre de petites Véſicules en forme de Vaiſſeaux ſéminaux, qui ſemblent la ſoûtenir dans l'eau. On voit s'élever ſur chaque Véſicule deux cheveux fins, d'où ſortent encore d'autres Véſicules, qui pouſſent elles mêmes deux nouveaux cheveux fins & pointus, qui terminent cette belle Coralline. Elle paroit avoir beaucoup d'affinité avec la Coralline à crête, de l'Article précédent; quoique d'ailleurs elles différent aſſez dans leur forme extérieure, pour qu'on ſoit en droit d'en faire deux eſpèces diſtinctes.

ON n'a pu trouver, après l'examen les plus exact, aucune ouverture aux Véſicules.

CETTE Coralline eſt repréſentée au naturel N°. 8. Fig. g. quoique ſes touffes ſoient ordinairement plus remplies.

LA Fig. G. eſt une petite branche avec un double rang de Véſicules; le tout groſſi au Mïcroſcope.

Planche XXIV. Fig. b. H.

N°. 9. *Corallina plumoſa nivea, fuco minimo, tereti adnascens.*
Coralline cotonnée & blanche comme de la neige.

MONSIEUR *Borlaſe* m'ayant envoyé de *Penzance* dans la *Province de Cornouaille*, quelques Corallines rares, j'y trouvai celle dont-il s'agit-ici, adhérente à un *Fucus*. Comme elle eſt très menue, je la pris d'abord pour le duvet blanc de quelques plumes; mais après l'avoir examinée, je trouvai que

Digitized by Google

Plate XV

que c'étoit une Coralline Articulée, & que ſes jointures, unies par de petits tubes, ne le cédoient en rien à celles de la plus grande eſpèce.

ELLE eſt repréſentée de grandeur naturelle, & adhérente ſur un morceau de *Fucus.* Fig. *b.* N°. 9.

ON voit en H. pluſieurs parties de cette Coralline, attachées par de petits Globules aux fibres du *Fucus.* Ces Globules pouſſent trois ou quatre Articulations cylindriques. Le tout eſt groſſi au Microſcope. Ces Globules & ces Articulations ſont encore plus groſſis en H. 1., toute la ſurface y paroit couverte de petits quarrés creux.

Remarques ſur quelques Corallines Articulées de la Jamaïque.

MON deſſein en plaçant ici ces Obſervations, eſt de faire connoitre la manière dont la Nature opére, dans les Pays plus chauds que le nôtre, & de mettre dans un plus grand jour la ſtructure admirable des Corallines de nos propres Climats. J'ai déja remarqué que nos Corallines Articulées, à l'exception de la première, ſont ſi denſes, & que leur ſurface eſt ſi unie, qu'on peut à peine en découvrir les pores, par le ſecours du Microſcope. Planche XXV. Fig. *a. b. c.*

MAIS les Corallines des Indes-Occidentales ſont généralement d'un tiſſu plus lâche : leurs Cellules, faites en forme de pores, & répandues ſur toute la ſurface, ſe voyent aiſément à l'œil ſimple, de même que les tubes qui uniſſent les Articulations.

LORSQUE par le moyen du Vinaigre on a diſſous la matière crétacée, on apperçoit, à l'aide du Microſcope, les tubes faits en forme de gonds ou de pivots, qui ſe diviſent en ramifications, leſquelles s'étendent ſur les ſuperficies plates de

chaque Articulation, & ſe terminent par des petites coupes, qui, jointes enſemble par les côtés, repréſentent au naturel les gâteaux des abeilles : chaque coupe a au fond un petit trou, par lequel elle communique avec un petit tube particulier de l'une des coupes des moindres branches ; & le ſommet de chacune de ces coupes, répond à un pore de la ſurface crétacée.

Les Fig. a. & b., repréſentent deux eſpèces de ces Corallines, de grandeur naturelle.

Les pores de l'une des Articulations de la Fig. a., ſont groſſis au Microſcope. Fig. A.

La Fig. A. 1., repréſente les ramifications régulières, & terminées par les ſurfaces plates, des petites coupes jointes enſemble, en forme d'un rayon de miel, après que l'on a diſſous par le moyen du Vinaigre la matière crétacée de l'Articulation de la Fig. A.

On voit en B. & B. 1., les Articulations, & les tubes ramifiés des plus petites eſpèces de la Fig. b. Elles y ſont repréſentées groſſies au Microſcope, & dépouillées de leur ſurface crétacée.

Je joindrai ici, à cauſe de ſa ſingularité, une troiſième eſpèce de Coralline Articulée. Il ſemble que c'eſt la *Corallina fiſtuloſa Jamaïcenſis candida, cum internodiis breviſſimis, & quaſi filo trajectis*, de *Plukenet*. Je l'appellerai Roſaire, ou Coralline à grains de Chapelet de la *Jamaïque*. Voyez Fig. c.

La Fig. C. repréſente un des grains groſſi au Microſcope ; au bas de la même Figure on a repréſenté le grain le plus proche ouvert, afin d'en découvrir le tube ; & l'on y voit des rangs réguliers de petits tuyaux, qui partant du milieu du tube, dont la ſubſtance tient de la nature de la corne, pénètrent à travers la matière crétacée, juſqu'aux Cellules de la ſurface. Voyez g.

Les

LES tubes ſemblables à une touffe de cheveux, repréſentés en C., & qui ſe trouvent au ſommet de chaque branche, paroiſſent être les ramifications, qui appartiennent au premier grain qui ſe formera.

LORSQUE la partie crétacée a été diſſoute dans du Vinaigre, on trouve pluſieurs petits corps ſemblables à des ſemences, & diſperſés parmi les Cellules, qui ſont faites en forme de cœur. Voyez Fig. C. 1.

IL y a enfin une autre Production Marine, qui approche beaucoup, par la manière dont elle croit, des Corallines Articulées. Elles m'a été envoyée parmi pluſieurs autres curioſités, trouvées ſur les Côtes de l'*Iſle de Wight*. Vue au Microſcope, elle paroit tubuleuſe, & différente de tout ce que nos Côtes m'ont offert juſqu'à préſent: Je l'ai appellée,

Corallina tubulata tenera, dichotoma, & puſtuloſa. Planche XXVII. Fig. *b.* B.
Coralline tubuleuſe à double diviſion.

EXAMINÉE au Microſcope, on la trouve remplie de verrues & de puſtules, qui ont chacune une petite tache au milieu. Elle paroit être tranſparente comme de la corne. Chaque paire d'Articulations, ou de branches, s'inſére au ſommet de l'Articulation ou de la branche qui eſt immédiatement au deſſous, de la même manière que dans quelques unes des plus petites Corallines Articulées que nous venons de décrire.

UNE petite partie de cette Coralline eſt repréſentée de grandeur naturelle, Fig. b.

ON en voit un autre petit morceau groſſi au Microſcope, Fig. B.

CHAPITRE VI.

Des Kératophytes.

APRES avoir parlé des Corallines, l'ordre naturel exige que nous nous attachions à décrire les Arbriſſeaux de Mer, ou *Frutices coralloïdes*, appellés par les Naturaliſtes, *Lithophytes*, *Lithoxyles*, ou *Kératophytes*. Ces différents noms ſervent à donner une idée de leur compoſition, qui au premier coup d'œil paroit conſiſter en une ſubſtance qui tient en partie de la nature du bois, ou de la corne, & en partie de celle de la pierre. Ces matières s'y trouvent diſpoſées différement les unes par rapport aux autres.

LEUR forme reſſemble généralement à celle des Arbriſſeaux; ils ont des baſes en forme de racines, par leſquelles ils adhérent à quelques Corps ſolides dans l'Ocean; on y remarque une tige ou un tronc, & des branches qui différent dans leurs diſpoſitions; Dans les uns ces branches ſont plus diſtinctes, & ſont ſubdiviſées en de petits rameaux ſeparés; au lieu que les autres ont leurs petites ramifications tellement entrelaſſées qu'elles forment une eſpéce de filet. C'eſt cette diverſité de leur figure qui leur a fait donner, par ceux qui en ont fait des collections, les noms d'Eventails de Mer, de Plumes de Mer, & d'autres ſemblables, qui ont du rapport avec leurs formes extérieures.

COMME je n'ai pas deſſein d'écrire un Traité complet ſur ce ſujet, je me contenterai de remarquer que la plûpart de ces *Kératophytes*, parvenus à leur point de perfection, offrent à un obſervateur attentif, les particularités ſuivantes.

PREMIÉREMENT, une ſorte de baſe ou de racine ligneuſe, qui eſt toûjours ou adhérente à quelque corps ſolide, tels que

que des Rochers, des Coraux, de grandes Coquilles &c., ou qui du moins laiſſe des traces, qui ſont voir qu'elle y a été attachée.

Cette baſe paroit conſiſter en fibres longitudinaires, ſi étroitement ſerrées les unes avec les autres, par leurs côtés, qu'on ne peut les ſéparer ſans effort. Ces fibres s'élévent de la circonférence de la baſe, juſqu'à la tige, où elles ont la même ſituation. En ſe ſervant de bons Verres, on peut ſe convaincre que ce même tiſſu ſe conſerve juſqu'aux extrémités des branches, & l'on découvre en même tems, que ces fibres, que l'on avoit priſes pour telles à l'œil ſimple, ſont réellement de petits tuyaux, dont tout l'Arbriſſeau eſt compoſé, mais qui ſont applatis & retrécis.

Si on coupe transverſalement le tronc, ou quelque groſſe branche de ces *Kératophytes*, & qu'on les examine avec attention, l'on découvre clairement le cours de ces tubes longitudinaux; & l'on apperçoit en même tems, qu'ils ſont placés en rond autour du centre du tronc, à peu près de la même manière que ces annaux circulaires qui ſe forment dans le bois, mais avec cette différence, que les premiers ne ſe touchent pas de ſi près que ceux-ci, & qu'il paroit viſiblement qu'ils ſont appliqués l'un au deſſus de l'autre, & ſouvent avec quelque matière hétérogéne entre deux.

La partie que nous venons de décrire eſt ce que quelques Naturaliſtes appellent la partie ligneuſe des *Kératophytes*; les autres la déſignent par un nom qui fait connoitre qu'elle reſſemble à de la corne, parce qu'elle en a l'odeur lors qu'on la brule.

Les particularités que nous venons de détailler, ſe trouvent preſque uniformément, dans toutes les eſpèces de *Kératophytes*, quelques différentes qu'elles ſoient d'ailleurs par leur gran-

grandeur, leur figure, & leurs autres qualités extérieures. Toutes paroiſſent avoir la même ſtructure, & la Chymie en tire les mêmes principes.

La partie qui imite le bois ou la corne, eſt revêtuë d'une eſpèce d'écorce pierreuſe ou calcaire, qui couvre le tronc & les branches, juſqu'aux extrêmités.

Cette écorce calcaire eſt fort mince à l'origine du tronc, mais elle devient plus épaiſſe à meſure que les branches avancent: En général cette enveloppe eſt à proportion beaucoup plus épaiſſe dans les plus jeunes fibres, ſi même elle ne l'eſt pas réëllement. Cette matière calcaire répand auſſi, lors qu'on la brule, une odeur ſemblable à celle des Corps Marins qui approchent de la nature de la corne. Dans pluſieurs ſortes de *Kératophytes*, cette écorce examinée attentivement, même à l'œil ſimple, préſente des ordres réguliers de pores ou de cellules; mais vûe au Microſcope elle paroit conſtamment être un corps organiſé, un aſſemblage régulier de cellules, ſemblables a celles dans leſquelles des animaux ont été formés, ou dans leſquelles ils ont vécu, & non une concretion fortuite, & faite de matières étrangéres, telle que celle qui couvre la mouſſe & d'autre végétaux, qui ont été accidentellement incruſtés dans des eaux pétrifiantes.

Quoique la plûpart des *Kératophytes*, lors qu'ils ſont en état de perfection, ſoient couverts de cette écorce calcaire, on en trouve pourtant ſouvent qui n'en ont point du tout. Il n'en faut cependant pas conclurre que ces derniers ayent été formés de cette manière; puis qu'il eſt plus que probable, qu'ils ont été dépouillés de leurs enveloppes, par la violence des ondes, ou par quelques autres accidens, qui leur ont enlevé une partie, qui ne paroit pas être moins eſſentielle à ces Corps, que l'écorce l'eſt aux arbres. C'eſt pour n'avoir pas fait cette refléxion, que les Botaniſtes ſe ſont ici trouvés em-

embaraſſés, & que *Boerhaave* lui même a été engagé à diviſer les *Kératophytes* en deux Claſſes, dont l'une comprend ceux qui ont l'enveloppe calcaire, & qu'il appelle *Titano Kératophyta*, & l'autre ceux qui en ſont dépouillés, ce qui arrive facilement près des Côtes: Il donne à ces dernières le nom ſimple de *Kératophyta*.

QUOIQUE les Obſervations que nous venons de rapporter ſoient aſſez fortes, pour prouver que les Arbriſſeaux de Mer ſont la fabrique d'un Animal, cependant comme il y a encore pluſieurs perſonnes qui n'en ſont pas bien convaincues, nous croyons devoir, par cette raiſon, entrer dans un examen plus exact & plus détaillé, de la nature de ces Corps Marins.

CEUX qui peu avancés dans leur cruë, n'ont encore que trois ou quatre pouces de haut, reſſemblent à un petit jet d'une Plante calcaire. Si on les diſſéque longitudinairement, & qu'on les examine avec attention, on y trouve au centre un Tube délié qui imite la corne, & qui contient une matière blanchâtre, comme de la moëlle; d'autres Tubes très petits lui ſont attachés, l'environnent, & le couvrent tout entier d'un bout à l'autre.

DANS les *Kératophytes* plus avancés, ces petits Tubes calcaires pouſſent, à l'endroit où les branches ſortent, de petites Cellules d'Animaux, du genre des Polypes, & chacune avec une ouverture. Ces Cellules ſont diſpoſées le long des branches, & toûjours avec une certaine régularité exactement appropriée à chaque eſpèce particulière: pluſieurs Naturaliſtes les ont confondues avec les nids des Inſectes qu'on trouve ſur les Plantes; mais ce qui auroit dû les détromper, c'eſt que ceux ci ſont placés au hazard, çà & là, & ſans aucun ordre, au lieu que les autres ont préciſément la même forme & le même arrangement, qu'on obſerve dans les Cellules des Corallines. On a vû les Animaux de ces Cellules s'étendre eux mêmes pour chercher leur nourriture, & les ma-

 tériaux

tériaux, qui leur ſervent à former ces logements, dont la ſtructure eſt ſi admirable. C'eſt ce que les Obſervations ſuivantes mettront encore dans un plus grand jour.

Il eſt rare que les Inſectes, qui bâtiſſent leurs nids ſur les Plantes, & qui vivent de leurs feuilles, en couvrent toute l'écorce depuis le pied du tronc, juſqu'au bout des branches: ſuppoſons cependant que celà arrive, on m'accordera auſſi que perſonne n'a jamais vû aucune Plante, qui étant ainſi toute incruſtée de Cellules d'Inſectes, continuât néanmoins de végéter & de fleurir. J'avouë que les véritables Plantes Marines, & il y en a un grand nombre de différentes eſpéces, ſont auſſi ſujettes à être attaquées par des Inſectes de Mer, qui y font leurs nids, que les Plantes de Terre: mais on remarque auſſi que dans ce cas là, les premières ont le même ſort que celles-ci, je veux dire qu'elles dépériſſent, & meurent enfin.

L'Epine de Hareng, décrite Planche X. Fig. a., reſſemble à ces *Kératophytes* dans ſa manière de croitre ſerrée, excepté l'incruſtation. Elle reſſemble en petit à cette eſpéce de Coralline à pannache, connue dans les *Indes-Occidentales*, ſous le nom de Plume de Mer.

Mais pour faire mieux voir la grande affinité qu'il y a, entre la ſtructure de ces *Kératophytes* à pannache, & celle des Corallines Véſiculeuſes, garnies de Denticules, je joindrai ici une courte deſcription d'une belle Coralline de *Sardagne*, appellée Plume de Mer, que je trouvai dernièrement parmi les Collections de Meſſieurs *Baker* & *Pond*, Membres de la Société Royale.

Ces belles Productions Marines ont environ un pied de haut: les petits rejettons ſont oppoſés alternativement l'un à l'autre, dans un ordre régulier, & ſitués de chaque côté de la

la principale tige. Ils ſont garnis de petites grappes compoſées pour l'ordinaire de trois tubercules, placés à égale diſtance, autour de la tige. Groſſis au Microſcope ils reſſemblent aux boutons des Arbres fruitiers. Le *Kératophyte*, qui fait le ſujet de cette deſcription, étoit ſec, & le ſommet de ſes tubercules étoit courbé du côté de la tige de la branche qui les portoit.

TOUTE la ſurface étoit couverte, comme le ſont la plûpart des Corps de cette Claſſe, d'une ſubſtance calcaire.

LA Fig. S. Planche XXVI. repréſente une des ramifications, avec la principale tige, qui eſt droite; On voit aiſément qu'elle reſſemble beaucoup par ſa forme, à celle du Sapin de Mer, Planche I. Fig. b.

ON voit en T. deux de ces rejettons groſſis au Microſcope, avec leurs petits tubercules.

LA matière calcaire de l'un de ces rejettons ayant été diſſoute dans une liqueur acide, & les deux tubercules placés ſur ſes côtés, étant ainſi dépouillés de leur enveloppe, nous y découvrîmes clairement deux Polypes avec leurs griffes contractées, Voyez Fig. V. Nous remarquâmes auſſi qu'ils étoient unis l'un & l'autre, au corps de l'Animal principal, par un filet délié & charnu, qui ſortoit de la partie inférieure de chacun d'eux. Ce filet charnu, qui conſtitue le centre de la tige, ou du corps de l'Animal principal, paſſoit par le milieu des tiges & des branches du *Kératophyte*; & nous pûmes ſans peine en ſuivre le cours, lors que l'écorce calcaire en eût été ôtée.

NOUS découvrîmes de la même manière les Polypes, inſerés par paires dans les tiges charnues & centrales de la Coralline Véſiculeuſe. N°. 7. Planche IV. Fig. C. & N°. 8. Planche V. Fig. A.

J'ai actuellement ſous les yeux quelques *Kératophytes*, qui prouvent que les cercles, faits d'une matière qui imite la corne, & qui environnent & compoſent la tige & les branches, ſont l'ouvrage d'Animaux. C'eſt en particulier ce que met hors de tout doute, un de ces *Kératophytes*, ou Eventails de mer, appellés par *Linnæus*, *Flabellum Veneris*. Voyez Planche XXVI. Fig. A. Ce *Kératophyte* avoit eu une des principales tiges de ſes branches, comme on le voit en B. rompuë par quelque accident, les deux bouts caſſés avoient été retenus l'un près de l'autre, par les petites branches de côtés, & faites en forme de réſeau. Voyez Fig. D.

Les Animaux, qui tachoient de s'élever le long du tronc Fig. K., en ſuivant le cours de leurs tubes, n'eûrent pas plûtot rencontré l'obſtacle que mettoit à leur chemin la tige rompuë, qu'ils ſe détournérent, & s'avançant vers D. le long des ramifications réticulaires, couvrirent tout l'eſpace vuide de leur matière calcaire, & ſemblable à de la corne. On a ôté les tuyaux calcaires, de la partie obſcure de la Figure, près de D, afin de faire voir que les parties qui ſont deſſous, dont la ſubſtance imite la corne, & qui ont toûjours la forme extérieure de tuyaux, ont pris le même cours, & ſuivi la même direction, que les tubes calcaires qui leur ont ſuccédé, & qui les ont couverts.

Les Animaux firent enſuite un petit detour, pour gagner le bout rompu de la partie ſupérieure de la tige de cette branche, le long de laquelle ils continuérent de s'avancer, comme à l'ordinaire, juſqu'aux plus fines ramifications.

La Fig. E. repréſente deux tubes calcaires, groſſis au Microscope. On les a coupés de l'écorce du tronc, près de la Fig. L. Les parties dont cette matière calcaire eſt compoſée, ſont tellement groſſies au Microscope, qu'on peut diſtin-

tinguer leur figure particulière, qui ne reſſemble pas mal à celle du Corail rouge.

On voit Fig. F. & I. un petit rejetton groſſi au Microscope; on l'avoit pris ſur le ſommet du *Kératophyte* Fig. O.

La Fig. G. repréſente une petite ramification de ce rejetton, dépouillée de ſa ſurface calcaire, qu'on avoit enlevée auſſi mince qu'on avoit pu, afin de découvrir les trois tubes qui ſe trouvent préciſement ſous cette ſurface: Ces tubes avoient aux deux côtés de petits trous, come ſi les Animaux avoient eu communication avec les deux rangs de Cellules placées ſur les côtés. Après avoir coupé une ſeconde tranche fort mince, nous découvrîmes le tube fait d'une ſubſtance qui imite la corne, & placé au milieu du rejetton, & les deux rangs de Cellules. Le tout eſt repréſenté ſur les ramifications oppoſées Fig. H.

Nous vîmes clairement que chaque Cellule avoit un petit Polype. Ils ſont repréſentés de grandeur naturelle en N, & leur forme eſt groſſie au Microscope en M. Ce *Kératophyte* avoit été apporté depuis peu, des *Indes-Occidentales*; les Animaux quoique contractés étoient cependant très viſibles. Les Polypes s'étendent par les trous obſcurs qui ſont ſur les côtés de la tige, & de la branche inférieure de ce rejetton groſſi au Miſcroscope. Voyez F. & I.

La Fig. I. eſt la partie inférieure coupée obliquement, pour faire voir les cavités des tubes & des Cellules.

Le bout du tube applati, & fait d'une ſubſtance qui imite la corne, occupe le centre de la Section. Les petites branches réticulées de ce *Kératophyte*, ſont encore plus comprimées; & vûes de front, leur bord mince ſe trouve alors tourné du côté du ſpectateur.

On a repréſenté en K. la Section horizontale de cette grande branche. On y voit les différents rejettons circulaires faits de tubes contractés; ils reſſemblent dans cet état aux cercles annulaires du bois.

Le même *Kératophyte*, ou Eventail de Mer, nous fournit une autre preuve bien remarquable que cette partie des branches, faite d'une matière qui imite la corne, eſt formée par les Animaux qui l'habitent.

Ce *Kératophyte* paroit avoit été arrêté dans ſa cruë, par quelque roc qui ſe trouvoit au deſſus, ou par quelqu'autre accident. Il ſemble qu'une partie de ſes branches ſupérieures ait été coupée horizontalement, en C, & que ce ſoit là ce qui a obligé les Animaux de rebrouſſer, en ſuivant la même route qu'ils avoient priſe. Auſſi trouve-t'on pluſieurs des dernières Cellules qu'ils avoient formées, couvertes d'une matière calcaire irrégulièrement répandue. Cette confuſion ſe fait appercevoir auſſi loin qu'on peut ſuivre la trace des Animaux, à leur retour; & ſi l'on enléve cette matière calcaire, on trouve que la ſubſtance, qui imite la corne, & qu'ils ont dépoſée en revenant, a rempli la plûpart des places vuides du réſeau.

Outre ce *Kératophyte*, dont la tige & les branches ſont faites d'une ſubſtance qui tient de la nature du bois, & de celle de la corne, j'en ai trouvé dernièrement un autre dans la Collection de Mr. *Collinſon* Membre de la Société Royale. Il avoit été apporté de la *Caroline Méridionale.* Son intérieur conſiſte en un tiſſu ſpongieux, & toute ſa ſubſtance eſt auſſi légére que du Liége.

Sa ſurface extérieure eſt compoſée d'une matiére friable & farineuſe, de la couleur du rouge de plomb, & peu différente de l'enveloppe du Corail rouge ordinaire, tel qu'il eſt lors qu'on nous l'apporte d'abord après qu'on l'a pêché, mais

Plate XXVI.

J. Myers, J. Myers sc.

mais elle eſt plus remplie de petits trous en forme d'étoiles. La matière qui compoſe les Cellules, qui ſont placées immédiatement au deſſous, eſt un peu ténace, mais elle eſt encore plus compacte intérieurement, & conſiſte en une ſubſtance ſpongieuſe, d'un rouge pâle.

La ſurface des principales tiges eſt environnée de tubes parallèles, dont on peut ſuivre le cours, tout le long des branches, juſqu'à-ce qu'ils ſe changent inſenſiblement en rangs de Cellules. C'eſt ce qui ſe voit auſſi dans quelques Corallines Celluleuſes.

La Fig. P. Planche XXVI, repréſente un petit morceau de ce *Kératophyte* ſpongieux, dans ſa proportion naturelle.

La Fig. Q. eſt une partie du ſommet de l'une des branches, coupée perpendiculairement par le milieu, pour faire voir la ſituation des Cellules. Ces rangs de Cellules environnent les jeunes branches de tous côtés; & la matière ſpongieuſe qui eſt entredeux paroit au Microscope remplie de cavités tubuleuſes & irrégulières.

Nous n'avons encore vû aucune eſpèce de *Kératophytes*, dans laquelle l'intérieur ſpongieux ſoit auſſi intimément uni à l'écorce celluleuſe, qu'il l'eſt dans celle-ci.

On a repréſenté Fig. R. la Section horizontale de la même branche, afin de mettre ſous les yeux les différents rangs de Cellules, qui en environnent le centre ſpongieux.

J'ai remarqué dans quelques *Kératophytes* à pannache, ou Plume de Mer, que lors qu'ils étoient morts en tout, ou en partie, le Polype qui vit dans cette eſpèce de Corail, qu'on appelle *Millepore*, en incruſte les branches mortes, d'une matière coralline & blanchâtre. Pluſieurs perſonnes, faute d'avoir examiné cette croute avec aſſez d'attention, s'y ſont trom-

trompées, & l'ont priſe pour une incruſtation calcaire, quoi que c'en ſoit une pierreuſe. Cependant, outre la différence des matériaux dont ces enveloppes ſont compoſées, il eſt encore bien aiſé de diſtinguer l'arrangement très exact de l'incruſtation naturelle, de l'irrégularité du Corail.

A cette Obſervation ajoûtons en une autre, qui la ſuit naturellement; c'eſt que nous n'avons jamais trouvé deux différentes ſortes d'incruſtations calcaires ſur une ſeule & même eſpèce de *Kératophyte*. J'en ai cependant vû trois différentes ſortes, qui étoient adhérentes à une pièce de Corail de Roche, ſur laquelle on voyoit auſſi une partie d'un *Kératophyte* mort, qui étoit incruſté du même Corail.

Les particules de cette écorce ſont d'une figure particulière dans chaque eſpèce, & pénétrent ſouvent profondément juſques dans le dernier rang des tubes. Ces tuyaux conſtituent la ſurface intérieure; & comme leurs parties calcaires ont été mêlées, avec les parties glutineuſes de l'Animal, ce mélange fait que leur ſubſtance tient de la nature du bois, ou de celle de la corne.

On ne trouve ſur cette eſpèce de Productions Marines, ni écorce, ni membrane, ni enfin aucune autre enveloppe extérieure, excepté cette couverture calcaire & celluleuſe; ce qui prouve qu'elle leur eſt naturelle.

Si on examine avec ſoin les Sections perpendiculaires & obliques des Arbres, & des Arbriſſeaux, ou même des tiges des Plantes Marines, on trouve que les Vaiſſeaux longitudinaires de la partie ligneuſe, ſont toûjours unis enſemble, par des fibres latérales, ou qu'ils ont des tuyaux placés ſur leurs côtés. Cependant quelque exactes recherches que nous ayons faites, avec le Microscope, nous n'avons jamais pû découvrir parmi les Vaiſſeaux de ces *Kératophytes*, ni parmi

mi leurs Tubes applatis & longitudinaires aucune de ces fibres qui ſervent de liens, ni aucun des Tubes qui portant de la moëlle, s'étendent juſqu'à la circonférence ; d'où il ſemble qu'on en puiſſe conclure, que la viſcoſité que ces Animaux répandent, eſt la principale cauſe de ce que ces Tubes ſont ſi étroitement unis entr'eux, & cela d'autant plus que ces Tubes, ſur tout lors qu'ils ſont bien ſecs, forment dans quelques *Kératophytes* des plus chauds Climats, un Corps beaucoup plus dur que le bois.

Le Corail rouge & pierreux de la Méditerranée, & les *Kératophytes*, ſe reſſemblent beaucoup dans leur tiſſu, & dans les principes que la Chymie tire de l'un & de l'autre. Il eſt vrai que le premier a ſes ramifications fort courtes, & que ſes Tubes ſe changent en pierre, & non en corne. Mais à ces deux légères différences près, tout nous donne lieu de croire que ces deux Corps ſont peu éloignés l'un de l'autre, dans la grande échelle de la Nature; le cours de leurs Tubes, la manière dont ils en augmentent la circonférence, de même que celle des branches, leur ſurface rude, friable, & ſemblable à de l'écorce, de même que les ouvertures à étoiles des Cellules, nous en donnent cette idée.

On voit ſouvent des *Kératophytes* réticulaires dont les Animaux, en s'avançant le long des tiges & des branches, rencontrent en leur chemin de petites Coquilles, & d'autres Corps étrangers, par deſſus leſquels ils forment leurs Tubes, où ils ſe trouvent renfermés.

C'est à peu près auſſi ce qui arrive aux Animaux qui forment le Corail rouge; on trouve ſouvent que leurs Tubes environnent un grand nombre de Corps différens.

Comme on découvre dans pluſieurs Plantes Marines, je parle de celles dont la végétation n'eſt pas conteſtée, une

Digitized by Google

ſorte de Vaiſſeaux ſéminaux, il ſemble qu'on en devroit trouver auſſi d'aſſez viſibles, ſur les plus grands *Kératophytes*, ſur ceux par exemple des Côtes de *Norvégue*, où nous ſavons de bonne part qu'on en a vû qui avoient juſqu'à ſeize pieds de long. Je ne crois cependant pas que perſonne y ait jamais remarqué la moindre diſpoſition à porter du fruit, à moins qu'on ne prit pour tel, ce qui paroit ſur leur écorce celluleuſe: Mais l'obſervation & pluſieurs expériences démontrent clairement, que, ce que cette écorce nous offre, a une beaucoup plus grande reſſemblance à l'ouvrage d'un Animal. Enfin les expériences Chymiques qu'on a faites ſur les *Kératophytes*, ſont une forte preuve, qui, au défaut même de toute autre démonſtration, devroit toûjours nous convaincre qu'ils appartiennent au Règne Animal.* Il ſuffira d'en rapporter une ſeule; c'eſt la grande quantité de ſels volatils qu'on en tire, & la forte odeur d'Huitres rôties, qu'elles répandent, lors qu'on les brule.

NOUS n'avons encore pû trouver ſur nos Côtes, que deux eſpèces de *Keratophytes*, & qui encore ſont aſſez rares. La première eſt.

Planche XXVII. Fig. a.

N°. 1. *Kératophyton Flabelliforme, cortice verrucoſo obductum.* R. S. pag. 3.
Eventail de Mer à Verruës.

CE *Kératophyte* trouvé ſur les Côtes de *Cornouaille*, eſt couvert d'une croute remplie de petits Tubercules ſemblables à des Verruës. Cette enveloppe extérieure étant diſſoute dans du Vinaigre, laiſſe voir à découvert des Polypes contractés, & armés de huit griffes.

ON voit Fig. a. N°. 1., un petit rejetton de ce *Kératophyte*. L'une des Verruës eſt repréſentée de deux manières différentes, & groſſie au Microſcope. Fig. A. & A. 1.

LA

Digitized by Google

Plate XXVII.

La Fig. A. 2., repréſente le Polype tel qu'il parût, lors que la matière crétacée eût été diſſoute. Les particules, dont l'incruſtation eſt compoſée, ſe voyent groſſies au Microſcope. Fig. A. 3.

N°. 2. *Kératophyton dichotomum, caule & ramulis leviter compreſſis.* R. S. pag. 32. Planche XXVII. Fig. g.

Saule de Mer.

Ce *Kératophyte* a été trouvé ſur les Côtes près de *Margate*; Nous en avons reçû depuis peu quelques autres d'*Irlande.*

On voit ſur les deux bords des branches plattes, des rangs réguliers de petites Cellules, qui s'élévent ſur la partie calcaire. Elles ont chacune un petit trou qui en fait l'entrée.

La Fig. g. N°. 2., repréſente un petit rejetton de ce *Kératophyte*, dans ſa proportion naturelle.

CHAPITRE VII.

Des Eſcares.

Quoique les *Eſcares* appartiennent proprement à la Claſſe des *Millepores*, cependant comme j'ai ſuivi généralement la méthode de *Ray*, je m'en tiendrai au nom qu'il leur a donné, & j'y joindrai des Deſcriptions, qui mettront aiſément les Naturaliſtes en état de les rapporter à la place qui leur convient.

La marque caractériſtique des *Eſcares*, ſuivant cet Auteur, eſt que leur ſurface reſſemble à une Toile ſur le métier: vûe au Microſcope, elle en donne l'idée par l'arrange-

ment de très petites Cellules, dont ſa ſurface eſt parſemée.

La grande reſſemblance qu'ont avec les feuilles des Plantes, les deux premières *Eſcares* que nous allons décrire, a engagé les Botaniſtes à les ranger parmi les *Fucus*.

N°. 1. *Eſchara foliacea, millepora, tenera anguſtior, foliolis quaſi abſciſſis, & Cellulis oblongis alternis utrinque inſtructa.* *Fucus marinus, ſcrupoſus, albidus, anguſtior, extrémitatibus quaſi abſciſſis.* H. Ox. III. pag. 646. R. S. pag. 43.
Eſcare à feuilles étroites.

Planche XXVIII. Fig. a. A.

La Nature, qui ne ſaute pas bruſquement d'une Claſſe à une autre, a ſuivi ici le même ordre, d'une manière bien digne d'attention, en paſſant de la Claſſe des Kératophytes à la première eſpèce de celle des *Eſcares*. On voit que dans ces dernières, les rangs de Cellules continuent de ſortir de petits Tubes, qui s'uniſſent enſemble & forment une ſorte de tige.

Celle-ci en s'élevant ſe partage en feuilles étroites, & compoſées de rangs réguliers de Cellules, faites en forme de Quarrés oblongs: placées alternativement l'une près de l'autre, & oppoſées à celles qui ſe trouvent en pareil nombre de l'autre côté de la feuille, elles reſſemblent par-là à un Rayon de miel. On voit ſortir de ces feuilles d'autres ramifications toûjours plus petites, & garnies elles mêmes de feuilles. Il y en a pluſieurs, qui paroiſſent être jointes enſemble à leur partie inférieure, par de petits Tubes, comme dans les Coralines: de cette manière, elles peuvent ſe plier & ſe mouvoir librement dans l'eau.

La Fig. a N°. 1. repréſente cette Coralline au naturel. On en voit deux feuilles, avec leurs petits Tubes, & leurs Cellules, groſſies au Microscope Fig. A.

L'une

Plate XXVIII.



Digitized by Google

Digitized by Google

Plate XXIX.



Digitized by Google

L'UNE de ces feuilles eſt repreſentée en B, coupée transverſalement, pour faire voir la ſéparation & la forme intérieure des Cellules.

N°. 3. *Eſchara foliacea, millepora, ſpongioſa, Cellulis arcuatis alternis utrinque inſtructa.* Planche XXIX. Fig. a. A.

Fucus telam lineam, ſericeamve, textura ſua æmulans. R. S. N°. 9. pag. 42.

Eſcare à feuilles larges.

CETTE Coralline, lors qu'on vient de la tirer de la Mer, eſt d'un tiſſu mou & ſpongieux, & répand une forte odeur de Poiſſon; mais ſi on la laiſſe pendant quelque tems ſur le rivage, elle devient ferme & ſemblable à de la corne, comme de certaines feuilles fânées. Ses deux ſurfaces examinées au Microſcope paroiſſent être couvertes de Cellules placées ſur une Membrane déliée, qui leur ſert comme de baſe & qu'il eſt aiſé de découvrir, en coupant transverſalement un morceau de la Coralline.

LA forme des Cellules eſt très remarquable; elles ſont toutes voutées au ſommet; mais par le bas elles ſe retréciſſent un peu des deux côtés, pour faire place aux voutes des deux Cellules voiſines, de-ſorte que par cette ſingulière conſtruction, il n'y a point d'eſpace perdu. Chaque Cellule a ſon entrée placée immédiatement au deſſous de ſa voute, & ſes parois ſont défenduës par des épines.

MR. *Juſſieu*, célébre Naturaliſte, ayant découvert dans cette Coralline de petits Polypes, qui s'étendoient hors des Cellules, en donna une Deſcription dans les Mémoires de l'Academie des Sciences, de l'année 1742.

IL n'y a que peu de tems, qu'examinant quelques *Eſcares* de l'eſpèce dont je parle, je découvris à l'entrée de pluſieurs

de leurs Cellules, un petit Corps teſtacé, ſemblable à une Coquille bivalve.

ON voit une de ces Cellules, avec la Coquille qui y eſt renfermée, groſſie au Micròſcope en E. Elle eſt de la couleur de l'Ambre, & ſi transparente qu'on peut voir, au travers, l'Animal mort qu'elle contient, & qui eſt ici marqué par une tache noire.

LA Fig. a, N°. 2. repréſente au naturel, une branche de cette Coralline, avec les feuilles.

UN morceau d'une feuille eſt repréſenté en A, groſſi au Microſcope, pour faire voir la forme extérieure & la diſpoſition des Cellules.

LA Fig. B. eſt le deſſein d'une feuille coupée transverſalement, & met ſous les yeux les différens compartimens des Cellules.

ON voit un ſimple rang de ces mêmes Cellules en C, rampantes ſur un *Fucus*; on y voit auſſi les Cellules de cet Inſecte de Mer, qui eſt ſi commun le long de nos Côtes, qu'il en infecte tous les Corps Marins.

Planche XXX. Fig. a. A. N°. 3. *Eſchara foliacea, millepora, lapidea, extremitatibus hinc inde irregulariter coalescentibus, utraque ſuperficie ex Cellulis ovatis conſtans.*

Eſchara retiformis. R. S. pag. 31. *Reticulum Marinum.* J. B. III. 809.

Coralline pierreuſe à feuilles.

CETTE *Millepore* pierreuſe fut trouvée au mois d'Avril 1753, adhérente à une Coquille d'Huitre, ſur les Côtes Occidentales de l'*Iſle de Wight.* Lors que nous la reçûmes, les Inſectes étoient morts, mais viſibles dans leurs Cellules.

LA

Plate XXX.



Digitized by Google

La Fig. a. N°. 3., en eſt un deſſein exact, & qui la repréſente croiſſant ſur une petite Coquille d'Huitre.

La Fig. A. eſt un morceau de la ſurface, groſſi au Microſcope, pour faire voir les entrées des Cellules.

On en voit une ſection transverſale en B., & une perpendiculaire en C., qui met ſous les yeux la forme intérieure, & les compartimens des Cellules, groſſies au Microſcope.

La Fig. b., eſt la repréſentation d'un morceau de Corail Italien, qui reſſemble aux cornes d'un Cerf, & qui eſt appellé par *Imperatus*, *Porus Cervinus*. Nous en donnons ici le deſſein, afin de faire voir, qu'examiné au Microſcope ſous différents points de vûes, la forme extérieure & intérieure des Cellules, eſt exactement la même que celle de la Coralline dont il s'agit ici. Fig. b.

La Fig. d., eſt repréſentée groſſie au Microſcope en D. On y voit un morceau de ce Corail Italien, environnant un *Fucus*, & ſes Cellules formées de la même manière que celles de nôtre Coralline, mais faites d'une matière plus molle. Leurs entrées ſont défenduës par des épines; & comme elles ſont d'un tiſſu ſpongieux, leur ſurface eſt auſſi plus pleine, & plus arrondie que celle des Corallines pierreuſes. Ces dernières, qui, lors qu'on les tire de la Mer, ſont enflées & rondes, s'affaiſſérent preſque juſqu'à devenir plattes, à meſure quelles ſe ſéchérent. Fig. d. D.

La Coralline qui je viens de décrire eſt appellée par *Ray*, *Eſchara retiformis*, & a été confondue avec une belle *Millepore*, dont par cette raiſon, je crois devoir donner ici la Deſcription. C'eſt le *Retepora Eſchara Marina* d'*Imperatus*, pag. 630. Planche XXV. Fig. d. D.

Elle croit ſur des Coquilles & ſur des Rochers, ſur les Côtes

Côtes d'*Italie*: Elle a la forme de feuilles irrégulières, & très ſouvent celle d'une coupe, ou d'un verre à boire, à bords irréguliers. Voyez Fig. d.

ELLE conſiſte en une combinaiſon de Cellules d'Inſectes, & toute ſa ſubſtance eſt percée régulièrement d'outre en outre, de pluſieurs trous, qui la font reſſembler à un filet. Les eſpaces, qui ſe trouvent entre les trous, du côté intérieur du Corail, ſont remplis des petites entrées des Cellules des Inſectes. Le tout ſe voit groſſi au Microſcope. Fig. D.

LE dos, ou la partie de deſſous du Corail, eſt auſſi groſſie en F., pour faire voir que les Cellules n'ont point d'ouverture de ce côté là.

Planche XXXI. Fig a. A.

N°. 4. *Eſchara millepora, foliacea & ſpongioſa, Cellulis, Coni inverſi formâ, oribus ſetaceis.*

Coralline à feuilles, ſpongieuſe & irrégulière.

LA Coralline de ces Inſectes ſi communs dans la Mer, dont la plûpart des Corps Marins ſont tout couverts, prend quelquefois la figure d'une feuille, comme la Coralline de l'Article précédent; mais on n'y remarque ni la même régularité, ni le même ordre dans la diſpoſition des Cellules.

LA Fig. a, N°. 4. repréſente au naturel, cette Coralline ſpongieuſe & irrégulière, dont on voit une partie groſſie au Microſcope Fig. A.

LA Fig. b, fait voir la manière dont ces Inſectes environnent quelques *Fucus*, & les enveloppent avec leurs Cellules.

C'EST ce qui a donné lieu à pluſieurs habiles Naturaliſtes de croire que les *Kératophytes* étoient de la même nature, je veux dire qu'ils n'étoient que de ſimples Plantes Marines, ſur leſquelles pluſieurs différentes eſpèces d'Inſectes de Mer faiſoient leurs nids calcaires. Mais nous nous ſommes déja aſ-

ſez

Digitized by Google

Plate XXXI.



P. Reid fe

Digitized by Google

ſez étendus ſur cette matière, & nous croyons avoir ſuffiſamment refuté les fauſſes idées qu'on s'etoit faites de la formation des *Kératophytes.*

LA Fig. D. repréſente quelques Cellules de la même eſpèce d'Inſectes de Mer communs: elles ſont groſſies au Microſcope, & adhèrentes au même Fucus, que les Cellules voutées de la ſeconde *Eſcare*, ou de la *Millepore* à feuilles: Mais la matière dont ces dernières ſont formées eſt d'une nature plus ferme. Ce Fucus a été tiré de la Mer, à une grande profondeur, près de *Falmouth*; il paroit plus uni & plus blanc, que celui que nous avons actuellement ſous les yeux, & il n'a point de cheveux. Planche XXIX. Fig C. D.

PENDANT que j'étois à Brighthelmſtone, j'eus occaſion de voir l'Animal qui loge dans ces Cellules. C'eſt un Polype à douze griffes, renfermé dans un petit Tube, au milieu de la Cellule, comme on le voit repréſenté & groſſi au Microſcope, Fig. D. 1., Planche XXIX. Ces Animaux, dès qu'on les trouble, ſe retirent dans leurs Tubes, ou dans leurs étuis, qui ſe ferment ſur eux, & ils s'enfoncent avec eux dans leurs Cellules.

N°. 5. *Eſchara millepora arenoſa Anglica.* R. S. pag. 31. *Lorica marina Imperati.* 688.
Millepore Angloiſe à grains de ſable. Planche XXV. Fig. e.

CETTE Production marine paroit au Microſcope comme un amas de Sable, uni par la matière visqueuſe de quelques Inſectes de Mer. Sa ſurface eſt plate, mince, & remplie de petites cavités, qui ont été habitées par les Inſectes.

ON en voit une partie repreſentée de grandeur naturelle, Fig. e.

Planche XXVII. Fig. e. E.

N°. 6. *Eſchara millepora, minima, cruſtacea, dilute purpurea, Cellulis tubiformibus, ordine fere æquali, & parellelo diſpoſitis.*

Petite Eſcare pourpre.

CETTE Incruſtation eſt compoſée de rangs circulaires, de tuyaux très petits & presque parallèles, d'un pourpre pâle, & moitié transparent: elle s'attache autour des tiges du *Fucus*, & aux Corallines à denticules.

ELLE eſt repréſentée au naturel, Fig. e, N°. 3. & groſſie au Microſcope en E. C'eſt proprement la *Tubulaire* de *Linnæus.*

Planche XXVII. Fig. *f.* F.

N°. 7. *Eſchara millepora lapidea, inſtar pumicis, poroſa.*
Eſcare poreuſe.

CETTE Incruſtation pierreuſe ſe trouve ſouvent ſur la Coralline à faucille: elle conſiſte en des maſſes irrégulières, qui reſſemblent à du ſable blanc, dont les grains ſont fortement colés enſemble; mais vue au Microſcope, elle ſemble conſiſter en un nombre infini de petites Cellules rondes, placées confuſément, & dont chacune paroit avoir ſon entrée circulaire au dehors, de ſorte qu'en l'éxaminant au Microſcope, on trouve qu'elle reſſemble à la pierre-ponce.

LA Fig. f, N°. 4. repréſente la grandeur naturelle des Cellules, qui ſont groſſies au Microſcope en F. Mais l'Incruſtation même eſt ſouvent plus grande que la partie groſſie en F.

CHA-

CHAPITRE VIII.

Des Coraux Anglois.

JE commence ce Chapitre par la définition que *Ray* donne du Corail dans ſa *Synopſis :* c'eſt une eſpéce de Plante preſque pierreuſe, dont les branches reſſemblent à celles d'un Arbriſſeau ſans feuilles, & qui n'a point de pores viſibles.

N°. 1. *Corallium pumilum album, fere lapideum, ramoſum. Corallium album pumilum noſtras.* R. S. pag. 32. *Iſis.* Linnæi Genera. 974. Planche XXVII. Fig. C.

Ce Corail conſiſte en ramifications courtes & irrégulières, qui paroiſſent être calcaires au dehors, & dont la ſubſtance eſt pierreuſe. Voyez Fig. c. N°. 1. Mais lors qu'on l'examine avec un Microſcope qui groſſit beaucoup, on le trouve plein de petits pores, tels à peu près que ceux de la Fig. B. Planche XXIV.

LA pêche de ce Corail eſt fort abondante près de *Falmouth.* Les Habitans s'en ſervent avec ſuccès pour engraiſſer leurs Terres. Voyez les obſervations que *Ray* a faites ſur ce Corail dans ſa *Synopſis.* J'en ai reçu depuis peu qui étoit d'un pourpre pâle, ou d'un rouge livide ; on l'avoit trouvé dans les filets de quelques Pêcheurs de Harangs, près de l'*Iſle de Man :* On m'en a auſſi envoyé d'*Irlande*, de la même eſpèce, & qui reſſemble à une grappe de très petits raiſins, d'une couleur blanchâtre.

N°. 2. *Corallium cretaceum lichenoides.*
Corallium maritimum calcariis rupibus adnascens. Mor. H. Ox. III. pag. 651. Planche XXVII. Fig. *d.* D.

Corail calcaire, & dont la forme reſſemble à celle de l'Hépatique.

CETTE Incruſtation calcaire s'attache aux Rochers, & aux Coquilles, & ſe trouve en grande quantité ſur les Côtes de *Cornouaille*. Si on examine bien ſoigneuſement la ſurface de ce Corail, elle paroit remplie de petits pores, qui deviennent preſque imperceptibles, lors qu'ils ont été quelque tems hors de la Mer. En ayant rompu un petit morceau, que je plaçai ſous le Microſcope, j'y d'écouvris ſur les cotés, pluſieurs étages de Cellules, ſeparées les unes des autres, comme elles ſont repréſentées en D.

SI on met un morceau de ce Corail dans du Vinaigre, ſa partie calcaire ſe diſſoud dabord, & les ſéparations, auſſi bien que les Cellules, deviennent très viſibles: Mais la partie membraneuſe reſte dans ſon entier, ce qui donne lieu de croire qu'elle eſt de la formation d'un Animal.

LA Fig. d. N°. 2., repréſente un morceau de ce Corail, adhérent à une de ces coquilles qu'on nomme *Lepas*, où Oeil de Bouc. Nous avons ſouvent trouvé de legéres Incruſtations ce Corail, ſur les petites branches de cette eſpèce d'Algue qui croit ſur les rochers, & qui eſt connue des Botaniſtes ſous le nom de *Conferva*, de même que ſur la ſurface de quelques *Fucus* larges & minces.

CHAPITRE IX.

Des Eponges.

ON croyoit déjà du temps d'Ariſtote, que les Eponges appartenoient au Règne Animal. C'eſt ce Philoſophe lui même qui nous l'apprend. * „Pluſieurs perſonnes, nous dit-„il, étoient dans l'idée que les Eponges ſont ſuſceptibles de „ ſentiment, & qu'elles ſe contractent, lors qu'on veut les arra-

* *Hiſtoria Animalium.* Lib. V. Cap. 16.

„ racher. Mais Ariſtote rejetta cette opinion, & fut ſuivi en cela par la plûpart de ſes Sectateurs. Il paroit cependant aſſez probable que les premiers qui eurent cette idée, y furent conduits par une ſorte d'expérience: s'il eſt vrai en effet que les *Eponges* ſoient le domicile, & la fabrique de Polypes, ou d'Animalcules d'un ordre particulier, on ne peut pas douter que tant de milliers de petits Animaux, qui ſe retirent ſubitement, & tous à la fois, dans leurs trous, à l'approche du danger, ne faſſent éprouver à la main, qui veut arracher toute la Colonie du lieu où elle eſt fixée, une réſiſtance, d'une nature bien différente de l'impreſſion, que feroit ſur elle un corps inanimé.

Les eſpèces d'Eponges qu'on trouve ſur nos propres Côtes, ſont en petit nombre, & pour la plûpart fort petites, & fort délicates. Il eſt rare d'en voir qui n'ayent pas été ſeparées depuis long-tems, du lieu où elles croiſſoient, & pour l'ordinaire leur Organiſation eſt beaucoup endommagée.

Cela eſt cauſe que je ne ſuis pas en état de donner une deſcription ſatisfaiſante, de la ſtructure & des uſages des différentes parties de cette Claſſe de Corps marins; quoique j'aye d'ailleurs examiné avec la dernière attention la plus part de ceux que nos Côtes nous offrent, outre un grand nombre d'eſpèces différentes, que j'ai trouvées dans les Cabinets des perſonnes de ma connoiſſance. Il n'y a guères que ceux, qui vivent près des lieux où croiſſent les Eponges, & qui ont le temps & l'habileté neceſſaires pour les obſerver, lors qu'elles ſont encore fraiches, qui puiſſent bien nous mettre au fait de leur nature & de leur proprietés. Si l'on choiſit une Eponge qui ait de grandes ramifications bien diſtinctes, & qu'on en éxamine avec ſoin un petit morceau au Microſcope, on trouve qu'elle ſort de pluſieurs petits Tubes, qui, en s'étendant & en s'élévant, pouſſent des branches de coté, dans toutes ſortes de directions. Ces branches s'entre-

laſſent l'une dans l'autre, s'uniſſent enſemble, & forment ainſi un réſeau compoſé, qui pénétre dans tout l'intérieur de la maſſe. Les extrémités des derniers rejettons, préſentent a l'obſervateur de petites ouvertures placées au bout de leurs fibres; & ſi l'on ſuit ces fibres, depuis leur ouverture juſqu'à leur racine, on trouve une ſubſtance molle & blanchatre, qui remplit la partie intérieure & creuſe de toute les ramifications par toute l'Eponge. Ces ramifications reſſemblent beaucoup à une corde de boyau, de couleur jaunâtre, & ſervent ſans doute de logement à des Animaux d'une claſſe particulière. J'avoue que nous n'y avons encore pu diſtinguer ni Véſicules, ni Cellules, n'y découvrir aucune autre eſpèce d'organiſation, que celle d'un Tube creux, qui, par ſes différentes inflexions, forme un grand nombre de figures très variées; les unes ont des branches, ſemblables à celles des Coraux; les autres s'élargiſſent comme des Champignons; celles ci ſont droites & d'une circonférence égale dans toute leur hauteur, comme une Colonne; celles là ſont larges au ſommet, étroites par le bas, & creuſes comme un entonnoir, avec des cavités régulières, des entrées, ou des ouvertures, qui ſont à peu-près les mêmes, dans toutes les Eponges de la même eſpèce. Cependant les principes que la Chymie tire des Eponges en général, & leur grande reſſemblance avec pluſieurs autres Claſſes de Productions marines, qui ſont inconteſtablement de la fabrique d'un Animal, nous autoriſent ſuffiſamment, ce ſemble, à les regarder auſſi comme telles, & à les rapporter au Règne Animal. Si nous ne pouvons pas en donner une deſcription auſſi detaillée, que celles que nous avons faites des autres Productions marines, c'eſt, comme nous l'avons déjà remarqué, parce que nous n'avons pas encore été à même d'examiner des Eponges fraiches.

De toutes les eſpèces d'Eponges, qu'on trouve le long de nos Cotes, je n'en decrirai ici que deux: je n'ai pas pû me pro-

procurer les autres en assez bon état, pour en pouvoir parler.

N°. 1. *Spongia ramosa Brittannica.* Park. 1304. R. S. pag. 29. N°. 1. Planche XXXII. Fig. *f.* F.

Eponge Angloise à branches.

Les Ramifications fibreuses de cette *Eponge*, sont extrêmement fines, tendres, & transparentes, d'un jaune pâle, & forment un très beau tissu. Les branches s'élévent irrégulièrement, mais perpendiculairement; elles s'entrelassent souvent les unes dans les autres, & sont un peu applaties le long des bords des cotés. A de certaines distances régulières, on y voit de petits trous ronds, semblables à ceux des Toiles d'Araignées.

La Fig. f. représente au naturel une branche d'une Eponge d'Angleterre; les ouvertures des cavités, qui sont le long des bords, se voyent en g.

La Fig. F. est un morceau du sommet de cette Eponge, grossie au Microscope.

N°. 2. *Spongia medullam panis referens.* Planche XVI. Fig. *d.*

Alcyonium ramosum molle, medullæ panis intus simile. R. S. pag. 31.

Eponge semblable à la Mie de pain.

Cette Eponge est d'une figure très irrégulière, & d'une couleur blanchâtre; elle croit souvent autour des *Fucus* & des Corallines. Toute sa surface est parsemée de petits trous qui se voyent à l'œil simple; mais en l'examinant au Microscope, on trouve que les intervales, qui sont entre ces trous, sont eux mêmes remplis d'autres trous très petits, chacun desquels a une entrée ronde & régulière, & semble être composé de petits paquets de fibres deliées & transparentes, qui se

ſe croiſent les unes les autres; comme ſi c'étoit l'ouvrage de quelque Animal. Ces fibres, ou, comme on pouroit les appeller, ces petits dards, ſont ſi fins & ſi aigus, qu'ils affectent la peau, comme ces ſortes de plantes, qui excitent une démangeaiſon à ceux qui les touchent.

La Fig. d, repréſente au naturel un morceau de cette *Eponge*; que l'on trouve ordinairement garnie de branches. Le petit morceau Fig. d. 1, eſt groſſi au Microſcope en D. 1, & fait voir de quelle manière les paquets de petits dards ſont diſpoſés, pour former les petits trous, dont toute la ſurface eſt couverte.

CHAPITRE X.

Des Alcyons.

Les *Alcyons* ſuivent les Eponges dans l'ouvrage de *Ray*. Cet Auteur les appelle une ſorte de plante qui croit dans l'eau, & qui comme les Champignons a différentes figures, & différentes ſortes d'enveloppes; les uns ont une peau graveleuſe, elle eſt calleuſe dans d'autres: Ils différent auſſi dans leur ſubſtance intérieure; elle eſt ſpongieuſe dans quelques eſpèces, & charnue dans d'autres.

Ceſalpin croyoit que cette Claſſe de Corps marins étoit compoſée de l'écume de la mer, différemment modifiée & colorée, & qu'ils croiſſoient ſur les rochers, de la même manière que les Eponges.

Nous ne les conſidérerons à préſent que comme des Productions marines, qu'on n'a encore pu rapporter à aucune autre Claſſe, & qui ſont principalement deſtinées à ſervir de nids & de matrices a des Animaux de mer.

N°. 1.

N°. 1. *Alcyonium pulmonis inſtar lobatum.*
An Pulmo marinus alter Rondeletii 132.? R. S. pag. 31. N°. 3.
Figue de Mer.

CET *Alcyon*, qui eſt d'une couleur d'olive foncée, & d'une ſubſtance charnue, répand une odeur fort déſagréable, lors qu'on l'ouvre. Il eſt plein en dedans de petites particules jaunâtres, qui lui ont fait donner le nom de Figue de Mer, par les Pêcheurs de qui je l'ai reçu, avec pluſieurs autres Productions de cette eſpèce, pendant que j'étois a *Whiteſtable*. Je me hâtai de le plonger dans de l'eſprit de vin, pour l'empêcher de ſe contracter, afin que je puſſe l'examiner en détail.

IL eſt repreſenté de grandeur naturelle. Fig. b.

EN l'éxaminant au Microſcope, je trouvai que toute ſa ſurface étoit couverte de petites étoiles à ſix rayons, qui reſſembloient à de petits Polypes armés de ſix griffes. C'eſt ce qu'on peut voir dans le morceau qui eſt repréſenté groſſi en C.

APRÈS l'avoir ouvert, j'ai trouvé que ſon intérieur conſiſtoit en un grand nombre de petits ſacs de couleur jaunâtre, & remplis d'une liqueur limpide & viſqueuſe; on voyoit au milieu un petit conduit, qui, paſſant par le centre de chaque étoile, aboutiſſoit à leur ſommet. C'eſt dans cet état qu'il eſt repréſenté groſſi au Microſcope. Fig. B.

EN examinant avec attention l'un de ces ſacs, j'ai découvert dans ce conduit intérieur, pluſieurs figures régulières, ſemblables à des Coquilles, & placées l'une ſur l'autre.

ELLES ſont repréſentées en D. groſſies au Microſcope. Mais j'ignore encore ſi, ce qui étoit renfermé dans ce tuyau, étoit la nouriture de l'Animal, contenue dans ſon inteſtin, ou ſon eſtomac, ou ſi c'étoit ſon Ovaire.

Digitized by Google

Planche XXXII. Fig. a. A.

N°. 2. *Alcyonium ramoſo-digitatum molle, aſteriscis undiquaque ornatum.* R. S. pag. 31. N°. 2.
Main ou Orteils de mort.

C'EST là le nom que les Pêcheurs ont donné à cette Production marine, dont la figure eſt ſi extraordinaire : ils la trouvent ſouvent dans leurs filets, lors qu'ils ſont occupés à la pêche des poiſſons plats. Elle eſt fort commune ſur les Côtes de *Kent*.

LA Figure a, en eſt une repréſentation faite exactement d'après nature. L'Alcyon qui m'a ſervi pour cela, étoit attaché, comme la figure le repréſente, à une Coquille d'Huitre; & comme on me l'a envoyé tout frais, dans de l'eau de Mer, j'ai été par là en état de l'examiner avec ſoin.

JE remarquai d'abord après l'avoir reçu, que ſa ſurface étoit remplie de petits mammelons, qui avoient, chacun à ſon ſommet, une étoile à huit pointes. L'ayant enſuite laiſſé repoſer quelque tems dans de l'eau ſalée, je vis ſortir de chaque petite étoile, un Polype à huit griffes, qui eſt repréſenté, & groſſi au Microſcope, en A.

EN examinant l'un de ces Polypes, avec un verre qui groſſit un peu plus les objets, j'obſervai que chaque griffe avoit des deux côtés des rangs de fibres courtes & déliées, telles que le duvet dont les ſemences de quelques Végetaux ſont garnies. Voyez Fig. A. 2.

J'AI remarqué dans le Corail pierreux, trouvé ſur le rivage près de la *Nouvelle York* quelque choſe de fort approchant de cette eſpèce de Corail charnu. On voit un morceau du premier Corail repréſenté en A. 1. Une des étoiles eſt repréſentée un peu groſſie au Microſcope en A. 3., afin de faire voir les marques que laiſſe la même ſorte de petites

Digitized by Google

Plate XXXII.



tes fibres, ou de griffes, dans les rayons de cette figure à étoile. Lorsque l'eau commença à ſe corrompre, les Animaux du Corail charnu moururent, & toute la ſubſtance répandit une odeur cadavereuſe. L'ayant enſuite fait ſécher, elle ſe contracta & devint légère comme de l'Eponge.

N°. 3. *Alcyonium, ſeu Veſicaria marina.* J. Bauhin. Savonnettes de Mer. Planche XXXII. Fig. *b.* B.

CETTE Production marine eſt compoſée de petites Veſſies jaunes, rondes, applaties, jointes enſemble en forme de boule, & fort rudes au toucher. On en trouve ſouvent ſur le bord de la Mer, & les Matelots s'en ſervent en guiſe de ſavon pour ſe laver les mains.

AYANT diſſequé quelques unes de ces Veſſies, j'ai trouvé qu'elles étoient les Ovaires, ou les Matrices du Buccin commun; chaque Matrice diſtincte eſt environ de la groſſeur de la moitié d'un grand pois, & contient pluſieurs embryons de poiſſons à coquilles, qui, à meſure qu'ils grandiſſent, étendent leur enveloppe, & forcent une porte en forme de Valvule, qui eſt placée ſur le bord antérieur de cette petite Veſſie; ils s'échappent par là, & pourvoyent enſuite eux mêmes a leur ſubſiſtence.

LA Fig. b. repréſente une de ces boules de grandeur naturelle.

ON voit en b., une des Matrices repréſentée ouverte, afin de faire voir la grandeur naturelle de l'embryon qui y eſt contenu.

CETTE même Matrice eſt un peu groſſie au Microſcope en B. avec une Valvule ſur le devant.

LES précautions admirables de la Nature, dans la Produc-

tion de quelques Poiſſons a Coquilles de cette eſpèce, ſe voyent d'une manière encore plus frappante dans cette ſorte de *Buccinum*, qui eſt appellé par *Liſter*

Planche XXXIII. Fig. a. A.

Buccinum ampullatum clavicula ſulcata, una parte cujuſque orbis in planum compreſſa. Liſter, Planche 878. & 879.

D'AUTRES l'appellent la Figue,. ou la Tour de *Babel.*

ON trouve cet Alcyon en grande quantité, ſur quelques Côtes de l'*Amérique Septentrionale*, & particulièrement ſur le rivage de la *Nouvelle-Tork* en *Virginie.*

LES Ovaires ou Matrices ſont d'une figure ovale & applatie; quelques unes ont la forme de cette coquille, connue ſous le nom de Patelle, où Oeil de Bouc, mais elles ſont plus plates vers le ſommet.

UN ligament rude & pliant joint ces dernières par un côté, & ſi près l'une de l'autre, qu'elles paroiſſent être couchées les unes ſur les autres. La porte en forme de voute, par laquelle les petits ſortent pour ſe retirer dans la Mer, lors qu'ils ſont en état de pourvoir à leur ſubſiſtence, eſt placée ſur le bord antérieur de ces Véſicules, & oppoſée au côté par lequel elles ſont unies enſemble.

LA Valvule, qui couvre cette porte, eſt faite avec un art admirable pour garantir les petits Animaux contre l'eau de la Mer, juſqu'a ce qu'ils puiſſent s'y expoſer ſans riſque. Pendant qu'ils ſont renfermés dans les Ovaires, ils ſont couverts d'une matière visqueuſe, qui reſſemble au blanc d'œufs, & qui ſans doute leur ſert d'aliment.

SI nous examinons attentivement ces Ovaires ainſi réunis, nous ſerons tentés de croire, qu'ils croiſſent, de même que les Animaux qu'lis renferment, après qu'ils ſont ſortis des coquillages auxquels ils doivent la naiſſance; car ils ſont trop

Plate XXXIII.



Digitized by Google

trop grands pour avoir jamais pû être contenus dans le corps d'aucun Buccin. Au premier coup d'œil, on les prendroit pour quelque choſe qui appartient au Règne Végétal: ils ne reſſemblent pas mal aux vaiſſeaux ſéminaux du Charme.

La Fig. a. repréſente un de ces cordons, de Matrices de Buccin de *Virginie*, de moyenne grandeur. Il paroit qu'il avoit été attaché à quelque rocher, ou à quelqu'autre corps ſolide, par la partie ſupérieure du ligament. Les Ovaires qui y ſont placés ſont d'abord petits, mais ils vont toûjours en groſſiſſant juſqu'au milieu. Ils diminuent enſuite juſqu'à l'autre bout du ligament, où ils conſervent à peine la figure d'Ovaires & ne ſont plus enfin que des corps informes.

La Fig. a. 1. met ſous les yeux les petits coquillages, de grandeur naturelle, & contenus dans un Ovaire, ſur le devant duquel on voit la petite Valvule fermée. Fig. a. 2.

La Fig. b. eſt la repréſentation du Buccin que *Liſter* appelle *Buccinum ampullatum*, & qui avoit été apporté de la *Virginie*.

N°. 4. *Alcyonium, ſeu Cyathus marinus.*
Coupe de Mer.

Planche XXXII. Fig. c. C.

Ces petits Corps marins, faits en forme de Coupe, ſe trouvent ſur les Côtes de *l'Iſle* de *Scheppey*, dans la Province *de Kent*. On en voit pluſieurs enſemble, qui ſont attachés debout à des pierres, & à des coquilles. Au ſortir de la Mer, ils ſont d'un beau jaune, moitié transparents, & conſiſtent en une ſubſtance rude au toucher, & qui imite la corne. Ils renferment une matière visqueuſe, & pluſieurs ſemences de couleur d'oranges, ou des particules qui reſſemblent a des œufs, & qui ſont placées au haut de chaque Coupe. Le tout eſt repréſenté groſſi au Microſcope. Fig. C. & de grandeur naturelle en c.

Je trouvai à *Ramsgate* au mois d'Août de l'année 1754. quelques Coupes marines de cette eſpèce. En ayant levé le couvercle qui eſt au ſommet, je découvris, à l'aide du Microſcope, qu'elles étoient remplies de petits Pétoncles parfaitement bien formés. Ils ſont repréſentés de grandeur naturelle en c., & un peu groſſis en C. On peut donc regarder ces Coupes de Mer, comme les Ovaires des Pétoncles.

On prie ceux, qui cultivent l'Hiſtoire Naturelle, d'obſerver ſur les Côtes, s'ils ne pouroient point découvrir au ſommet de chacune de ces Coupes quelque petit Animal de l'eſpéce des Polypes. Ce qui nous engage à leur faire cette prière, c'eſt que nous avons déjà trouvé quelque choſe d'approchant à cela, dans la Figue de Mer, ou dans le premier *Alcyon* de cette Claſſe. Voyez Fig. D. Planche XVII.

Planche XXXII. Fig. d. D.

N°. 5. *Alcyonium, ſeu Fucus nodoſus & ſpongioſus:* R. S. N° 42. pag. 49.

Alcyon à nœuds.

La Figure de cet Alcyon eſt fort irrégulière. Il conſiſte en une ſubſtance gluante & de couleur jaune. On le trouve adhérent à la plupart des Productions marines ſur les Côtes de *Kent*, & particulièrement près de l'Iſle de *Sheppey*; où il donne beaucoup de peine au Pêcheurs, dont il embaraſſe les filets.

Le Fig. D. repréſente un Alcyon coupé tranſverſalement, & plein de petites tâches régulières, que le Microſcope y fait découvrir. D'autres Alcyons, que j'ai examiné depuis, m'ont paru être remplis de petites figures régulières & ovales, telles que celles de la Fig. D. Planche XXX.

Je regarde actuellement cet Alcyon, qui mérite bien qu'on l'obſerve avec plus d'exactitude, comme étant le frai de quelque eſpéce nombreuſe de Poiſſons à Coquille. Je joindrai ici la Deſcription d'une belle Production marine, dont la figure paroit

BIBLIOTECA NAZIONALE
NAPOLI

Plate XXXIII.



paroit très ſinguliere, lors qu'on l'examine au Microſcope. Elle a tout l'air d'une plante, & peut-être que c'en eſt une. On lui a donné le nom de

Fucus maritimus, Gallopavonis pennas réferens. H. Ox. III. pag. 645. T. 8. f. 7. Planche XXXIII. Fig. c.

Fungus auricularis. Cæſ. Ej. Pin. 368. II. R. S. N° 14. p. 43.

Plume de Coq-d'Inde. *Dale's* Hiſt. of *Harwich.*

COMME elle reſſemble a l'Agaric bigaré, c'eſt peut-être ce qui fait qu'on la conſidére comme un Champignon de Mer. Elle eſt droite, mince & plate, & a pluſieurs feuilles qui ſortent de la même Tige.

ELLE eſt repréſentée au naturel Fig. c.,

SES Racines vûes au Microſcope ſemblent être diviſées en de petits Tubes tranſparents, & faits de pluſieurs articulations égales & oblongues, dont chacune contient une ſubſtance molle.

ON voit en e., un petit morceau de la racine, dont une partie eſt repréſentée groſſie au Microſcope Fig. E.

LA Tige plate, & les feuilles larges & minces, ne ſont que la continuation des Tubes articulés, qui s'élévent à côté l'un de l'autre, & croiſſent en ſe joignant, de manière que les articulations ſe trouvent placées alternativement l'une par rapport à l'autre. Voyez la Fig. D., qui repréſente une partie d'une feuille groſſie au Microſcope; mais elle eſt repréſentée de grandeur naturelle en d.

LA ſurface entière de chaque feuille paroit être couverte d'un pellicule extrémement mince & blanchâtre, qui porte les impreſſions des petites articulations régulières, & faites en quarrés longs.

LES lignes ombrées & courbes qui ſe voyent en c., à une di-

dixième de pouce l'une de l'autre, ſont remplies de particules brunes, & ſemblables a des grains de ſemences. Ces grains en muriſſant rompent les membranes minces & blanches qui les couvrent, & qui en ſe retirant laiſſent ces corps ronds à découvert & prets à tomber, tels qu'on les voit en D.

LORSQU'ON les éxamine avec un Microſcope qui groſſit d'avantage, ils paroiſſent reſſembler a des pepins de raiſin, enfermés de tous côtés, excepté à la baſe, dans une ſubſtance visqueuſe & tranſparente. Voyez Fig. F.

CHAPITRE XI.

Des Coraux Tubuleux.

IL me reſte à parler dans ce Chapitre de quelques autres corps marins que le hazard m'a préſentés. Je commencerai par décrire une Maſſe de Sable irreguliére, qui paroit avoir été cimentée par une eſpéce particulière de Vers de Mer. Je lui donne le nom de

Planche XXXVI. Fig. A. B. C.

Tubularia arenoſa Anglica.
Corail Anglois ſabloneux & tubuleux.

ON en trouve ſouvent d'aſſez grands morceaux ſur les Côtes près de *Tarmouth*, lorſque la marée eſt baſſe, & près de *Dieppe* en *France*. C'eſt de cette dernière Ville qu'eſt venu la piéce qu'on voit repreſentée de grandeur naturelle en A. On l'avoit apporté à *Mr. Emanuel Mendez da Coſta*, Membre de la Société Royale, qui a eu la bonté de me l'envoyer. Toute cette Maſſe avoit ſix pouces de long, cinq de large, & trois d'épais. Elle étoit d'une couleur de ſable foncé, d'un tiſſu caſſant, plutôt légère que peſante, poreuſe de tous côtés

Plate XXXVI.



Digitized by Google

tés, mais dans quelques endroits on appercevoit quelques ouvertures particulières.

La partie ſupérieure de la Maſſe, qui eſt repréſentée de front en A., eſt d'une fabrique très ſingulière.

On peut la comparer à pluſieurs petits entonnoirs un peu aplatis, placés obliquement l'un ſur l'autre, & ſi près, que le bord ſupérieur de chaque entonnoir eſt caché par le bord inferieur de celui qui eſt au deſſus. Ils ſont placés ſi obliquement, qu'on voit ſans peine le trou qui eſt au fond, & qu'on peut regarder comme le tuyau de l'entonnoir. Ces Tubes pénétrent depuis le fond de l'entonnoir juſqu'à environ la moitié de la profondeur de la Maſſe ſabloneuſe, non en droite ligne, ni par tout d'un même diamétre, mais en ſerpentant, & ils ont plus ou moins de calibre ou de profondeur, à proportion de la grandeur de l'Animal qui loge dans chaque entonnoir. Ces Tubes paroiſſent ouverts, ſelon leur longueur, dans la ſection perpendiculaire repréſentée en B. B. Mais leurs différents calibres ſe voyent en C., où ils ſont coupés transverſalement.

On remarque ſur la plus part des Cellules un petit couvercle de ſable, que les Animaux forment vraiſemblablement pour leur propre ſureté & pour leur défenſe, lors que quittant la partie ouverte de l'entonnoir, ils ſe retirent dans le tuyau.

Ces Tubes, comme nous l'avons déjà remarqué plus haut, n'ont pas la même dimenſion, & ne ſont pas non plus toûjours droits. Mais ils ont tous ceci de commun, c'eſt qu'ils ſont fermés par le bas, les Animaux rempliſſant la partie qu'ils laiſſent derrière eux, à meſure qu'ils s'avancent, par une appoſition continuelle de particules ſablonneuſes, & collées enſemble par la matière glutineuſe, qui ſort de leurs Corps.

Le Microſcope fait découvrir dans les Architectes de ces Habitations contigues, pluſieurs choſes dignes d'être remarquées. Ils ſont repréſentés de grandeur naturelle Fig. a. b., & groſſis au Microſcope, Fig. c. d. On voit par ces deux dernières figures que ces Animaux appartiennent au genre des *Scolopendres*.

La tête (e. f.) conſiſte en trois rangs ovales de plumes plates, fermes, & d'un beau poli, ſemblable à celui de la perle. L'Animal peut les mouvoir à ſon gré, en différentes directions, & pour différens uſages. La fente longitudinaire, qui ſépare ces trois rangs, eſt la bouche, vers laquelle le rang le plus intérieur eſt incliné. Chaque rang de plumes eſt diviſé en deux parties, & eſt mû par différents muſcles.

Les deux muſcles du rang extérieur ſont immédiatement ſous lui, & paroiſſent être inſerés dans le devant du cou. Ses plumes ſont crochues aux extrémités, & placées à chaque diviſion, comme ſi elles ſe tournoient pour rencontrer les autres de front. La partie ſupérieure du corps a ſix pieds, trois de chaque côté. Ils reſſemblent à des nageoires, & ſont compoſés chacun de ſix plumes, en forme de rame.

Les petits pieds placés ſur chaque côté, juſqu'a la queue, ſont compoſés de touffes de petites plumes fort aigues & brillantes.

On voit au centre du corps, une molécule ronde, qui eſt probablement la matrice, ou l'Ovaire de l'Animal.

Deſcription d'une Coralline Tubuleuse *de* Malthe.

Comme les Polypes ne ſont pas les ſeuls Animaux, qui conſtruiſent des Corallines Tubuleuſes, j'ai cru qu'on ne ſeroit pas faché de trouver ici la deſcription de quelques Tubes curieux, faits par des Animaux différents. Ceux qui ſont repré-

Plate XXXV.



Digitized by Google

préſentés Planche XXXIV. ont été apportés de l'Iſle de *Malthe*, dans de l'eſprit de vin, & c'eſt Mr. *Collinſon*, Membre de la Société Royale, qui a eu la bonté de me les communiquer. Je les ai appellés

Corallina Tubularia Melitenſis, Scolopendris, tentaculis duobus duplicato-pennatis inſtructis. Planche XXXIV. Fig. *a. b. d. e.*

An Penicilla marina?

Coralline Tubuleuſe de *Malthe.*

LORS que j'eus tiré les Tubes, & les Animaux de cette Coralline, hors de l'eſprit de vin, dans lequel ils avoient été conſervés, j'y découvris un petit ſac glaireux, dans lequel les baſes, ou les racines, de pluſieurs de ces Tubes étoient inſérées. Voyez Fig. d.

CES Tubes, qui ſont faits par les Animaux mêmes qui y ſont renfermés, augmentent en diamètre par degrés, à meſure qu'ils croiſſent en hauteur. L'enveloppe extérieure des Tubes eſt couverte de rayes circulaires, & compoſée d'une matière, qui reſſemble à de la terre de couleur de cendre, différemment ombragée & liée par un fort ciment. La membrane intérieure, qui eſt très étroitement attachée à l'extérieure, eſt faite d'une ſubſtance dure, & transparente comme de la corne, mais dont la ſurface eſt très liſſe. La cavité du Tube eſt parfaitement ronde, quoique l'Animal qui y fait ſa demeure, & qui eſt de l'eſpèce des *Scolopendres*, reſſemble un peu par ſa forme à une Sangſue étendue & applatie. Il paroit par les marques de ſes pieds, qu'on voit à l'intérieur, qu'il peut ſe tourner librement de tous côtés, ſe lever, s'étendre, ou ſe retirer, comme il lui plait, ſoit pour attraper ſa proye, ſoit pour la mettre en ſureté, lorſqu'il l'a ſaiſie.

CETTE *Scolopendre* a deux bras ou deux griffes bien remarquables; le bras gauche eſt beaucoup plus grand que le

droit; ils ſont l'un & l'autre garnis d'un double rang de plumes, comme on le voit Fig. C., ou ils ſont repréſentés groſſis au Microſcope.

CET Animal a plus de 150. pieds de chaque côté. Le deſſein que j'en ai donné Planche XXXIV. me diſpenſe d'entrer dans un plus grand détail. On voit en b. le ventre de l'Animal, de grandeur naturelle, & pendant hors du Tube. Il eſt groſſi au Microſcope en B. La Fig. a. repréſente le derrière de la tête de l'Animal dans ſon Tube. A. eſt le dos de l'Animal un peu groſſi. La Fig. e. repréſente l'intérieur du Tube, avec les ombres des couches couleur de cendre, qu'on voit à travers la membrane intérieure, qui eſt auſſi transparente que de la corne.

Remarques ſur la formation du CORAIL ROUGE, *& de quelques eſpèces de* CORAIL BLANC.

Planche XXXV. Fig. a. c. LE Corail rouge de la *Mediterranée*, ſi bien connu dans ce Pays, paroit être formé d'une ſuite de petits Tubes, dont pluſieurs croiſſent enſemble, & pouſſent des branches en différents ſens; ce qui fait que ce Corail reſſemble au tronc, ou aux branches courtes, de quelques arbriſſeaux de Mer pétrifiés.

J'AI actuellement devant moi quelques Coraux, dans leſquels on voit pluſieurs petits Tubes, qui rampent enſemble, pour ainſi dire, ſur des morceaux de Corail blanc, & qui varient leurs directions, ſuivant les obſtacles qu'ils trouvent en chemin.

CES petits Tubes ſont applatis & contractés, & ſans doute que la même choſe a lieu dans les principales branches. Les premiers étant compoſés d'une matière crétacée, & mêlée avec la ſubſtance viſqueuſe de l'Animal, ſe contractent & devien-

viennent ſolides, à meſure que leurs habitans les abandonnent; c'eſt-à-dire, que les différentes particules dont ils ſont compoſés, s'attirent fortement les unes les autres, & deviennent dures comme du ciment, fait de matières Animales. Le Corail récent eſt couvert d'une ſubſtance rouge & farineuſe, qui ſemble en être l'écorce. Lors qu'on l'examine avec ſoin, on trouve ſur ſa ſurface pluſieurs cavités en forme d'étoiles. Voyez Fig. a.

L'ENVELOPPE farineuſe étant enlèvée, on découvre que les étoiles ont une communication avec les Tubes qui ſont au deſſous. Les pointes des branches préſentent des marques évidentes du bout de ces Tubes, comme on le voit Fig. c.

ENFIN la dernière envéloppe, compoſée d'une ſuite de petits Tubes qui ſe ſont élevés, & qui ont environné le Corail, eſt d'une couleur jaunâtre, & ces petits Tubes ne ſont pas ſolides, comme ceux qui ſont plus en dedans. Les Pêcheurs de Corail les trouvent pleins d'un jus laiteux, qui n'eſt autre choſe que le corps tendre de l'Animal.

LES cavités en forme d'étoiles reçoivent ſans doute cette figure des griffes de certains Polypes, qu'il eſt naturel de regarder comme les Architectes & les habitans de ces belles Habitations.

LA ſubſtance farineuſe & de couleur d'écarlate, qui couvre la ſurface, eſt repréſentée en A., groſſie par le verre le plus fort du Microſcope de *Wilſon*; on y voit en même tems les figures des croix creuſes & combinées enſemble, dont les habitans de ce Corail tirent ſans doute de grands avantages, ſoit pour eux mêmes, ſoit pour leur logement; quoique nous ignorions encore l'uſage qu'ils en peuvent faire.

CE que nous avons dit plus haut de la tige & des branches de la Coralline, nommée Epine de Harang, & qui eſt

repréſentée Planche X, avec ſes petits Tubes groſſis au Microſcope, Fig. B, eſt très propre à repandre du jour ſur la manière dont le Corail croit, par une ſucceſſion conſtante de Tubes qui s'élevent, environnent le tronc, & pouſſent enſuite des branches. Mais comme cette Coralline eſt compoſée d'une matière légère, ſpongieuſe & élaſtique, les cavités ne ſe ferment pas; mais la tige ſe durcit, & reſte en même tems poreuſe & ligneuſe comme un jonc. Quoiqu'il ſoit dangereux, en matière de Phyſique, de tirer des conſéquences générales de Phénoménes particuliers, cependant le tiſſu du petit Corail blanc, repréſenté dans ſa forme & dans ſa grandeur naturelle en b, a tant de conformité avec ce que de la Nature opère, dans la formation des Corps Marins, qui ſont le ſujet de cet Ouvrage, qu'on ſeroit tenté preſque de croire, que les Coraux pierreux ſont faits pour la plûpart de la même manière, c'eſt-à-dire, qu'ils ſont compoſés de Tubes formés par des Animaux de l'eſpèce des Polypes.

Le Corail, que je viens de décrire, eſt très bien repreſenté & groſſi au Microſcope en B. On y peut ſuivre le cours des Tubes, depuis la baſe ſur la partie extérieure des branches, & dans l'intérieur leurs ouvertures ne ſont pas moins viſibles.

C'est le Docteur *Fothergill* qui m'a fait préſent du Corail qui fait le ſujet de cet article, de même que du Corail rouge. C'eſt lui encore, qui non ſeulement m'a procuré l'occaſion d'examiner pluſieurs Eponges rares, pluſieurs Coraux, & pluſieurs Lithophytes, mais qui a encore eu la bonté de m'aider dans cet Ouvrage.

DESCRIPTION

d'un Polype de Mer en Bouquet, *trouvé dans la* Mer du Nord, *près de* Pole.

Planche XXXVII.

Je donnerai à cet Animal extraordinaire le même nom que *Linnæus* donne aux Polypes communs, & qui convient, propre-



Digitized by Google

BIBLIOTECA NAZIONALE "V. E. III" NAPOLI

Digitized by Google

prement à celui-ci. *Hydra Marina Arctica, corporibus multis octitentaculis, baſi conjunctis, & ſcapo prælongo oſſeo, ſuſtentatis.*

Je l'ai fait repréſenter en petit en a, afin de donner une idée claire de ſa figure, lors qu'il eſt dans l'eau.

Il fut pris dans l'été de 1753, par le Sr. *Adrianz*, Capitaine du Vaiſſeau *Britannia*, employé à la pêche de la Baleine. Cet Animal ſe trouva attaché à ſa ſonde à 236 braſſes de profondeur, à 79 dégrès de Latitude Nord, à 80 Miles des Côtes de *Groenland.*

Sa partie ſupérieure conſiſte en 23 Corps de Polypes, attachés par leurs queues à une baſe commune, de façon qu'ils forment un ſeul Animal. Il eſt repréſenté de grandeur naturelle, avec une partie de ſa tige étendue, Fig. A.

La Fig. B. le repréſente dans l'état où je le reçus, avec ſes griffes étendues, après qu'il eut été trempé dans l'eau. Pendant tout le tems que je l'éxaminai il exhala une odeur rance, ſemblable à celle du Poiſſon ſec & près de ſe corrompre; il avoit une couleur de fer rouillé.

La ſection transverſale Fig. F. met ſous les yeux la ſituation de ſes différents Corps, dont dix occupent le cercle exterieur, neuf celui qui ſuit, & quatre le centre.

Le même Capitaine prit en même tems un autre de ces Polypes en Bouquet avec trente Corps unis enſemble. Mais ayant été bleſſé un peu au deſſous de la jonction de ces Corps, cet accident l'avoit tellement defiguré, qu'il n'offroit plus aux yeux qu'une maſſe informe.

Suivant le rapport de cet Officier, lors que l'Animal fut près de la ſurface de l'eau, les Polypes, dont il eſt compoſé,

ſe, étoient étendus, & reſſembloient à un bouquet fait de fleurs brillantes, jaunes, & en forme d'étoiles. Voyez Fig. A.

CHAQUE Polype diſtinct a huit griffes ou bras, chacun desquels eſt garni des deux cotés, de rangs de fibres qui paroiſſent faire les fonctions de doigts. La bouche, qui eſt placée au centre des bras, à l'endroit ou ils s'uniſſent, a deux lévres droites & dentelées.

AYANT diſſequé un de ces Corps ſelon ſa longueur, Voyez Fig. G, j'y ai decouvert pluſieurs petites particules ſemblables à des ſemences, qui étoient contenues dans les cavités celluleuſes d'un muſcle fort & ridé, qui compoſoit toute la longueur intérieure. Ces particules ſont repréſentées de grandeur naturelle en 1; mais, groſſies au Microſcope, elles paroiſſent rondes & applaties, telles qu'on les voit en L. Peut-être qu'elles ſont le frai de l'Animal.

DE la baſe muſculeuſe & dentelée, où les Polypes ſont unis, repréſentée par la partie inférieure N. de la Fig. B, ſort une membrane creuſe en forme de veſſie. Voyez Fig. M.

CETTE membrane, longue de deux ou trois pouces, eſt retenue dans un état de tenſion, par le ſommet delié, vouté & entortillé de la tige oſſeuſe, qui eſt auſſi inſerée au milieu de la même baſe muſculaire & dentelée.

CETTE veſſie paroit être deſtinée au même uſage, que celles qui ſe trouvent dans les poiſſons qui nagent, je veux dire, que c'eſt par ſon moyen que l'Animal s'éléve ou s'enfonce dans la Mer, à ſon gré: elle lui ſert encore comme de canal, pour conduire les materiaux, que ces différents corps ramaſſent, & qui leur ſont néceſſaires pour la défenſe & l'accroiſſement de leur longue tige oſſeuſe; partie qui paroit être de la dernière importance pour la conſervation & le bien-être d'un Animal ſi extraordinaire, & ſi compoſé.

SI

Si on ſuit le cours de cette membrane, ou de cette veſſie, en deſcendant, on verra qu'elle s'attache à la tige en l'environnant, qu'elle en devient comme une pellicule qui la couvre dans toute ſa longueur, juſqu'au bout, où elle ſe termine en un cartilage.

La tige eſt blanche comme de l'yvoire, & quarrée, avec des rainures de chaque côté. Mince à ſon origine, elle va en groſſiſſant juſqu'à un quart de pouce quarré, ſur plus de ſix pieds de long, mais à la diſtance de quatre ou cinq pouces de la baſe, elle commence à ſe contracter, & finit en pointe. Voyez Fig. E.

Cette partie eſt couverte d'un cartilage jaune, tirant ſur le brun. Elle eſt repréſentée ouverte, afin de faire voir que la partie oſſeuſe, ou qui reſſemble à de l'yvoire, finit au milieu.

La Fig. D. repréſente le bas de la tige, là où la membrane, ou pellicule, commence à devenir Cartilagineuſe. La même Fig. repréſente au naturel la baſe de la tige, qui eſt ouverte en E.

On voit en I, une petite partie de la pellicule, qui a été arrachée de deſſus la tige.

La Fig. C, repréſente une partie de la tige, qui a été tordue apparemment, lors qu'elle étoit plus jeune & plus tendre.

La Fig. H. eſt une ſection transverſale de la tige, groſſie au Microſcope; afin de faire voir les différentes lames en forme de demi-cercle, enfermées les unes dans les autres, & formant différents compartiments.

Je voulus couper une tranche de la tige, mais j'éprouvai la même reſiſtance que ſi elle avoit été en partie de pierre &

en partie d'yvoire. Un morceau que j'en jettai ſur la table, rendit le même ſon qu'auroit fait une pipe.

UNE tranche fort mince, que j'en coupai avec peine, & que je mis dans du vinaigre, fermenta avec violence. Après avoir changé le vinaigre deux ou trois fois, je trouvai que la matière crétacée ou pierreuſe étoit diſſoute, & qu'il n'étoit reſté que les membranes, qui enveloppent les petites lames; d'où je conclus que la tige tenoit autant de la nature du Corail, que de celle de l'os ou de l'yvoire.

ON voit en K la figure d'un *Encrinus* ou *Lilium Lapideum*, qui n'eſt peut-être que les dépouilles pétrifiées de l'Animal dont nous parlons. Je me rapporte à cet égard au jugement de ceux qui s'attachent à l'étude des Foſſiles; je ne crois cependant pas qu'ils ayent encore rien avancé de plus probable ſur ce ſujet.

J'AI conſulté *Roſinus*, Auteur Allemand, qui a publié à *Hambourg*, un traité qui roule particulièrement ſur ce curieux Foſſile, dont il a en même tems donné un fort beau deſſein: toute la différence que j'y ai trouvée eſt, qu'un *Encrinus* eſt plutôt une ſorte d'Etoile de Mer, avec une tige ou une queuë articulée; & que les rayons de l'Etoile, au lieu d'avoir des griffes, comme nôtre Polype, ſont garnis intérieurement de pluſieurs rangs de fibres articulées, ce qui fait que chaque rayon reſſemble à une broſſe.

IL me ſemble donc que nôtre Polype eſt d'un tout autre genre, & qu'il a été juſqu'à preſent abſolument inconnu.

CHA-

CHAPITRE XII.

De la manière dont les Animaux des Corallines Véſiculeuſes ſe multiplient, avec quelques autres découvertes Microſcopiques, faites au mois de Juin 1755.

J'AI remarqué dans l'Introduction, qui eſt au commencement de cet Eſſai, que ceux, qui avoient pris les Corallines Véſiculeuſes pour des Végetaux, avoient aſſigné, & même avec quelque apparence de raiſon, différents uſages aux Véſicules, ou petites ampoules qu'on y trouve. Si par exemple on examine avec ſoin les vaiſſeaux ſéminaux de quelques eſpèces de Mouſſes terreſtres, & particulièrement de celles que les Botaniſtes nomment *Hypnum* & *Bryum*, on y trouvera une grande reſſemblance avec ces Véſicules. D'autres Naturaliſtes ont cru, qu'elles étoient deſtinées à ſoûtenir dans l'eau leurs tendres ramifications, comme les petits globules creux, qui ſont fixés ſur de petits pédicules, & placés le long des branches de l'Acinaire, (eſpèce de *Fucus*, qu'on trouve en ſi grande quantité dans les Pays chauds, que baigne *l'Ocean Atlantique*;) ou comme les ampoules du Chêne de Mer de nos propres Côtes. Mais comme les petites ampoules des Corallines ont généralement une ouverture au ſommet, il eſt clair qu'elles ne ſont pas propres à cet uſage.

COMME j'étois occupé au mois de Juin 1754, à obſerver à *Brightbelmſtone* dans la Province de *Suſſex*, quelques Productions marines de cette claſſe, je découvris que les Véſicules de la Coralline appellée Chêne de Mer, Planche V. Fig. A, étoient habitées par une eſpèce de grands Polypes, qui partoient du corps charnu, qui occupoit le milieu de la tige droite, & des branches, & qui paroiſſoient ne faire qu'un tout avec lui; mais cette découverte me cauſa plus de ſurpriſe, qu'elle ne me donna de ſatisfaction.

L'ÉTÉ de l'année ſuivante, j'obſervai ſur les Côtes de *Suſſex*, conjointément avec Mr. le Dr. *Schloſſer* d'*Utrecht*, & Mr. *Ehret*, que le grand Polype de la Coralline à grandes denticules alternes, Planche II. Fig. B, avoit déchargé ſon Ovaire, qui étoit plein de petits oeufs joints enſemble, & renfermés dans une membrane mince. Cet Ovaire pendoit encore à l'ouverture du Véſicule, tel qu'il eſt repréſenté, & groſſi au Microſcope, Planche XXXVIII. Fig. A. Mais on le voit de grandeur naturelle Fig. 1. Cette découverte nous fit eſpérer, que nous trouverions quelques autres Corallines de cette eſpèce, qui contiendroient dans leurs Véſicules quelques grands Polypes, avant qu'ils euſſent pondu. Mais toutes nos recherches à cet égard furent inutiles. Cependant, en examinant au Microſcope pluſieurs ſortes de Corallines, nous en trouvâmes une de l'eſpèce nommée Fil de Mer, voiez N°. 18. Planche XII. Fig. A & C, & repréſentée premièrement de grandeur naturelle, Planche XXXVIII. Fig. 3, & groſſie enſuite au Microſcope Fig. B. R. C. Elle avoit pluſieurs Véſicules, dont quelques-unes contenoient des oeufs attachés à un cordon umbilical, comme en C. Nous vîmes diſtinctement, à travers la petite ampoule transparente, que ce cordon tiroit ſon origine de la partie charnue de la principale tige de la Coralline, & qu'il y étoit inſéré. Nous découvrimes dans d'autres Véſicules, que ces œufs commençoient à s'animer; ils nous parurent être évidemment de jeunes Polypes vivants, qui déployoient dans un ordre circulaire, les griffes qui partoient de leurs têtes, comme dans les autres Polypes.

ILS ſont repréſentés en B, s'étendant hors de leurs Véſicules par le moyen du cordon umbilical. Pendant que nous étions occupés à les examiner, nous en vîmes quelques-uns, qui s'étant detachés, tombérent au fond du verre plein deau, où nous les avions mis; ils commencérent enſuite à ſe mouvoir,



Digitized by Google

Digitized by Google

voir, & à s'étendre, de la même manière que les Polypes d'eau douce.

Je dois avertir ici, que juſqu'à préſent j'avois pris les Coupes de cette eſpèce de Coralline, qui eſt repréſentée Planche XIII. & XIV. N°. 20 & 21, pour des Véſicules: mais en comparant les Fig. B. R. C. avec la Fig. A. Planche XXXVIII, il paroit qu'elles ſervent aux mêmes uſages que les Denticules.

Nous avons découvert dans une autre Coralline Véſiculeuſe, repréſentée Planche XI. Fig. a & A, mais plus particulièrement Planche XXXVIII. Fig. 4, & groſſie au Microſcope Fig. D. & T., une ſuite de Véſicules régulières, placées alternativement, qui ſortoient de la tige principale, à l'inſertion des branches capillaires. Nous avons pû voir clairement, que ces Véſicules étoient remplies de petits Oeufs.

Ayant examiné au Microſcope cette Coralline miſe dans de l'eau de Mer, tout l'intérieur, de même que celui de ſes racines & de ſes branches, lequel eſt marqué dans la Fig. par une ligne ponctuée, nous a paru évidemment être animé.

C'est là tout ce que nous avions à dire ſur la manière dont les Animaux des Corallines Véſiculeuſes ſe multiplient. Les autres Fig. de la Planche XXXVIII, qu'il nous reſte à expliquer, ſe rapportent à d'autres Obſervations miſcellanées, que nous allons détailler.

La Fig. 2. repréſente un de ces Vers à Coquilles tubuleuſes, qu'on trouve en grand nombre ſur nos Côtes, adhèrents à d'autres Coquillages, & ſouvent auſſi réünis en maſſes, compoſées de leurs propres Coquilles. La Fig. S. eſt l'Animal qui y fait ſa demeure, & qui paroit être de l'eſpèce des Scolopendres. Il a deux bras, qui ont chacun pluſieurs griffes, garnies de franges aux côtés ſupérieurs. Près de l'inſertion Planche XXXVIII.

du bras gauche, on voit s'élever une figure ſemblable à une trompette droite, dont tout le bord eſt dentelé.

Au côté oppoſé, eſt une petite figure tubuleuſe & droite, un peu gonflée, & pointue près du ſommet. La partie renfermée dans la Coquille reſſemble à une Sangſue étendue, mais ce qui augmente la beauté de cet Animal, c'eſt que ſa couleur a tout l'éclat de la plus belle écarlate qu'il ſoit poſſible d'imaginer. Ce Poiſſon à Coquille tubuleuſe, a beaucoup d'affinité avec les Corallines tubuleuſes, décrites Pl. XVI. XXXIV. & XXXVI.

La Fig. V. eſt une repréſentation, groſſie au Microſcope, d'une partie de la Fig. 6. On y voit, de quelle manière les petits Polypes contenus dans les denticules de la Coralline à faucille. Pl. VII. Fig. a. & A., paroiſſent vivants dans l'eau de Mer, lors qu'ils ètendent leurs bras. Ils ſont tous unis à la ſubſtance charnue, qui remplit les Tubes, dans leſquels ces denticules ſont inſérées.

En examinant cette Coralline, nous remarquâmes deux petits Polypes rouges & charnus, d'une forme ſingulière, & qui étoient adhérents, chacun par une tige, au côté de la branche Fig. 6.

Ils ſont encore plus grands que la Fig. 5. ne les repréſente. Mais ils ſont un peu groſſis au Microſcope. Fig. E. E. & l'un d'eux l'eſt beaucoup en F.

L'Animal peut à ſon gré étendre ou contracter cette eſpèce de rayons, qui partent de la circonférence, & qui ſont marqués par des points; il peut les faire ſortir hors des rayons du centre, ou les y retirer. Ces derniers rayons ſont ainſi comme autant d'étuis des premiers.

Ce n'eſt au reſte que par hazard que ces Polypes ſe trouvent

vent adhérents aux Corallines Véſiculeuſes, avec leſquelles ils n'ont d'ailleurs rien de commun, & nous n'en avons fait ici mention, qu'à cauſe de la ſingularité de leur forme.

La Fig. 7. repréſente une Coralline Celluleuſe bien remarquable: c'eſt celle qu'on appelle à têtes d'Oiſeaux, à cauſe des petites figures, ſemblables à des têtes d'Oiſeaux, qui ſont placées ſur les côtés des Cellules extérieures. Elle diffère de celle, qui eſt repreſentée Pl. XX. N°. 2. Fig. a. & A., en ce qu'elle a plus de rangs de Cellules jointes enſemble, que ces Corallines n'en ont communement.

Ces rangs de Cellules ne ſont ordinairement qu'au nombre de deux. Les Fig. I. K. L. repréſentent ſous trois aſpects différents ces têtes d'Oiſeaux, que nous vîmes, pendant tout le tems que nous les obſervâmes, ſe léver & ſe baiſſer, ouvrir & fermer leurs bouches, par intervalles.

Ces Polypes ſe retirent dans leurs Cellules, & en ſortent avec une viteſſe incroyable. Ils ſont repréſentés exactement dans ce premier état de contraction en N., mais on les voit étendus hors de leurs Cellules en M. La Fig. G. repréſente le devant d'un morceau de cette Coralline avec quelques uns de ſes Polypes dans leurs Cellules, tels que nous les vîmes au Microſcope.

La Fig. H. eſt le dos de cette même Coralline; on y voit les queuës des Polypes à travers leurs couvertures transparentes.

La Fig. 8. eſt une eſpèce d'Eſcare, mince comme du papier; ſes feuilles ſe terminent au ſommet, en forme de hache. Nous l'avons trouvée adhérente à la Coquille d'un grand Pétoncle; & nous l'avons appellée *Mouſſe de papier*, & en Latin, *Eſchara papyracea, utrimque cellifera, ſummitatibus ſecuris aciei inſtar truncatis.*

On

On en voit une partie groſſie au Microſcope en O., afin de faire voir les Figures des Polypes dans leurs Cellules.

La Fig. P. eſt la ſection transverſale des Cellules des deux ſurfaces, avec la paroi mitoyenne qui les ſepare, comme dans les rayons de miel.

CONCLUSION.

J'ai préſenté à mes Lecteurs dans cet Eſſai, un détail circonſtancié de ce que j'ai trouvé de plus remarquable dans les Corallines; j'y ai joint une Deſcription fidelle de leurs principales eſpèces; & des Animaux qui y ſont leurs domiciles, & qui ſont inconteſtablement du genre des Polypes. Ce ne fut d'abord que par hazard que je m'attachai à les étudier; des découvertes inattendues excitérent enſuite & ſoûtinrent ma curioſité. La nature de mes occupations ne m'ayant pas permis d'y conſacrer tout mon tems, j'ai crû devoir du moins emploier mes heures de loiſir, à examiner des objets, qui, tout petits qu'ils ſont en eux mêmes, ſont cependant auſſi admirables qu'amuſants. Indépendamment des autres avantages que j'ai retiré de mes recherches, elles m'ont encore procuré le bonheur de faire connoiſſance & de me lier d'amitié avec pluſieurs perſonnes, qui font également honneur à leur Patrie & à l'Humanité; & je me fais un devoir d'avouer ici que j'ai puiſé dans leur converſation de grands ſecours pour la compoſition de cet Ouvrage. J'y ai évité les conjectures autant qu'il m'a été poſſible; & ſi je m'en ſuis permis quelques unes, ç'a été moins dans le deſſein de faire recevoir mes idées à mes Lecteurs, que d'engager ceux, qui ſont en état de le faire, à les refuter ou à les établir.

J'avouë cependant que je ſuis fort porté à croire que la plûpart de ces Corps Marins, que leurs figures ont fait prendre juſqu'à préſent pour des Arbriſſeaux, des Plantes, & des Mouſ-

Mouſſes de Mer, ſont non-ſeulement le domicile d'Animaux, mais qu'ils ſont encore leur ouvrage, & qu'ils ſervent à leur conſervation, leur défenſe, leur propagation; en un mot qu'ils ont les mêmes uſages, que les Gâteaux & les Cellules que les Abeilles, & d'autres Inſectes, ſe conſtruiſent.

Si toutes les différentes eſpèces de Corallines, decrites dans cet Ouvrage, ne ſont pas de ce genre, il y en a au moins pluſieurs qui en ſont inconteſtablement. En vain m'objecteroit-on, qu'il eſt preſque incroyable que des Animaux d'un tiſſu ſi mou, ſi peu capable de reſiſter à la plus légére impreſſion, tels que ſont tous les Polypes connus juſqu'à préſent, puiſſent cependant ſe conſtruire des habitations d'une matière ſi unie, ſi dure, & ſi peu poreuſe qu'elle eſt ſuſceptible du plus parfait poli. Les Huitres & tous les Poiſſons à Coquilles, ne ſont-ils pas dans le même cas? La ſolidité & la dureté preſque inaltérables de leurs écailles, ſont elles moins étonnantes que le Corail rouge, par exemple, dont la fermeté égale celle de la pierre? Cependant ces Coquilles ſont fabriquées par les Animaux les plus mous, & qui ont le moins de conſiſtence, de même que les Coraux, & les Corallines pierreuſes ſont conſtruites par les Polypes.

Pluſieurs de ces Corallines ſemblent conſiſter en un ſeul Tube, qui contient un ſeul Polype mère. Chaque branche, que la Coralline pouſſe, contient un jeune Polype, né du prémier, qui en dépend, & qui eſt néanmoins capable de produire ſon ſemblable, en pouſſant une nouvelle branche; & ainſi de ſuite, auſſi loin que les loix preſcrites à chaque eſpéce, le leur permettent. D'autres Corallines conſiſtent en pluſieurs pareils Tubes unis, qui croiſſent, s'élévent enſemble, & qui, placés côte-à-côte l'un de l'autre, forment un cercle autour des Tubes qui ont été abandonnés par les Polypes qui les ont produits. Ces derniers deviennent ainſi la baſe & le ſoûtien du logement de leurs petits; & ceux-ci ſerviront auſſi

à leur tour de fondement à la génération qui les ſuivra.

Ces Tubes reſtent vuides dans quelques Corallines, mais la Section fait au moins découvrir les Veſtiges des cavités applaties; c'eſt ce qui ſe voit dans pluſieurs *Kératophytes*: Au lieu que dans pluſieurs Coraux pierreux, ces trous ſont ſi exactement remplis, qu'ils ne laiſſent aucune trace de cavités tubuleuſes, excepté au dehors; il eſt même très probable que celles-ci auroient auſſi été également effacées par une nouvelle Colonie, ſi les Coraux étoient reſtés plus long-tems dans la Mer.

On trouvera peut-être qu'il y a de la précipitation à conclure, que non-ſeulement les Corps qu'on vient de decrire dans cet Eſſai, ſont l'ouvrage d'Animaux, mais encore que ces Corps plus compacts, connus ſous le nom de Pierres étoilées, ceux que leur figure a fait appeller *Cerebrites*, les Champignons pétrifiés, & autres ſemblables, qu'on nous apporte de différents endroits des *Indes-Orientales* & *Occidentales*, ont la même origine. Il y a cependant une préſomption bien forte en faveur de cette opinion; c'eſt que dans tous les Climats les plus chauds, la Mer près de ſes bords, & par tout où on a pû faire des Obſervations, eſt tellement remplie de différentes ſortes d'Animaux, qu'il n'y a aucun Corps inanimé qui puiſſe y reſter long-tems ſans que quelque eſpèce s'en empare. Dans ces Pays, la quille des vaiſſeaux, les rochers, les pierres, en un mot tout-ce qui eſt inanimé, eſt d'abord couvert d'une infinité de domiciles d'Animaux. Les branches mêmes des Végetaux vivants, qui pendent dans l'eau, ſont immédiatement chargées du frai de différents Animaux, & de Poiſſons à Coquille de pluſieurs ſortes. Ces derniers eux-mêmes, lors qu'ils ſont affoiblis par l'âge, deviennent le fondement d'une nouvelle Colonie d'Animaux, contre les attaques desquels ils ne peuvent plus ſe défendre.

Si la vie animale eſt donc répanduë avec tant de profuſion, que ni les Corps inanimés, ni les Végetaux qui ont encore toutes leurs forces, ni les Animaux eux-mêmes lors que leur vigueur naturelle eſt diminuée, ne peuvent être à couvert de pareilles uſurpations, peut-on croire que les Corps, dont nous parlons, en fuſſent auſſi exempts que nous trouvons qu'ils le ſont, s'ils étoient abſolument inanimés? En un mot, n'y eût-il point d'autre raiſon pour appuyer le ſentiment que nous venons d'avancer, cette conſidération ſeule ſuffiroit pour le rendre plus que probable; c'eſt que les Polypes, qui habitent les Corallines, les Coraux, les Pierres étoilées, les Cérébrites &c., peuvent ſe défendre contre les attaques de leurs ennemis, auſſi long-tems qu'ils conſervent toute leur vigueur: mais lors qu'ils ſont affoiblis par l'âge, ou par quelqu'autre accident, ils ont alors le même ſort que tous les autres Corps inanimés qui ſont dans la Mer, je veux dire, qu'ils ſont obligés de céder à une force ſupérieure, & de ſervir de fondement à une nouvelle Colonie plus puiſſante & plus heureuſe.

Ces Découvertes ne paroitront peut-être pas aſſez importantes, pour mériter toute la peine qu'elles m'ont couté. Quelque jugement que d'autres en portent, je me trouve bien dédommagé du tems que j'ai donné à ces Recherches: elles m'ont ouvert de nouvelles ſçénes de Merveilles étonnantes, en me faiſant voir la variété & le nombre infini des Animaux, dont toute la Nature eſt peuplée. Il ſe peut auſſi que les faits, que j'ai rapportés dans cet Ouvrage, & que les exemples que j'y ai produits d'Animaux, là où jamais on n'en avoit ſoupçonné, piqueront la curioſité de pluſieurs de mes Lecteurs, & leur feront goûter la même ſatisfaction, & le même plaiſir que j'ai reſſenti dans la contemplation de ces objets. Mes Eſſais pourront encore animer ceux, qui ont plus de génie & de pénétration, à pouſſer plus loin ces Recherches, & à en tirer de nouvelles preuves, (ſuppoſé que nous n'en eûſſions

pas déja de ſuffiſantes,) que tout ce que cet Univers renferme de bon & de parfait, eſt l'ouvrage d'un ſeul Etre, infiniment ſage, tout puiſſant & tout bon. Nous en devons enfin retirer tous cette leçon, c'eſt que ſi des créatures, qui occupent un rang ſi bas dans la grande échelle de la Nature, ſont cependant douées de facultés qui les mettent en état de remplir parfaitement le but pour lequel elles ont été faites, nous, qui ſommes ſi fort élevés au deſſus d'elles, nous nous devons à nous mêmes, & nous devons à nôtre Créateur, une application conſtante à acquérir ce degré de perfection, auquel les facultés, dont nous ſommes enrichis, nous mettent en état d'atteindre.

DESCRIPTION DU MICROSCOPE AQUATIQUE DE Mr. CUFF,

Dont on s'eſt ſervi pour faire les Obſervations contenues dans cet Ouvrage.

A. PIlier de cuivre, qui ſert de ſoûtien à tout le Microſcope.

B. Bras, terminé par un Anneau.

C. Verre plat, ſur lequel on met les objets; il y a une tâche noire, ſur laquelle on place les objets opâques. Ce verre s'ajuſte dans une rainure de l'Anneau, B.

D. Verge de cuivre cylindrique, qui ſe peut hauſſer & baiſſer, pour trouver le foïer de la Lentille avec laquelle on obſerve.

E. Bran-

Pl. xxxix.



Digitized by Google

Digitized by Google

E. Branche de cuivre où l'on fixe à vis la Lentille, & qui eſt mobile, de façon qu'on peut promener cette Lentille ſur tous les points du verre C.

F. Lentille Microſcopique, enchaſſée au milieu d'un Miroir concave d'argent.

G. Autre Lentille ſemblable, mais qui groſſit plus que la précédente.

H. Bras terminé par un demi cercle.

I. I. Miroir concave, deſtiné à refléchir la lumière vers en haut, & mobile ſur deux pivôts, fixés aux deux extrêmités du demi cercle H.

K. Boëte qui renferme tout l'appareil du Microſcope, & ſur le couvercle de laquelle on fixe à vis le Pilier A.

L. Verge de fer mobile dans une couliſſe; une de ſes extrêmités ſe termine en pointe, & l'autre eſt armée d'une pince, pour ſaiſir les objets qu'on veut examiner. On la place dans le trou qu'on voit à côté de l'Anneau B.

M. Verre concave, tel que celui d'une Montre, qu'on emploie au lieu de verre plat C., lorſqu'on veut obſerver des objets dans l'eau.

N. Petit Cylindre d'yvoire, noirci d'un côté, & blanc de l'autre, pour y placer les objets opâques. On le fixe à l'extrêmité pointuë de la verge L.

O. Pinces dont on ſe ſert pour ſaiſir les objets.

P. Pinceau avec lequel on nettoye les verres.

CATALOGUE DE LIVRES,

Qu'on trouve à la HAYE

CHEZ PIERRE DE HONDT.

NOVUS THESAURUS Juris Civilis & Canonici, in quo junctim exhibentur varia & rariſſima optimorum Interpretum, imprimis Hiſpanorum & Gallorum, Opera: utrumque Jus ex humanioribus Litteris, ac veteris Ævi Monumentis, illuſtrantia, ex muſæo *G. Meermanni*, JCti & Syndici Roterodamenſis. VII. vol. Hagæ Com. 1751. fol.

—— Idem Liber, charta majori. VII. vol. folio.

Nouveau Dictionaire Hiſtorique & Critique, pour ſervir de Supplement ou de Continuation, au Dictionaire Hiſtorique & Critique de Mr. *Pierre Bayle*, par Monſieur *Jaques George de Chauffepié*, à la Haye 1751. à 1756. 4 vol. fol.

Hiſtoire Naturelle Générale & Particulière avec la Deſcription du Cabinet du Roi, par Mrs. Buffon & d'Aubenton, 3 vol. 4to. avec des Figures gravées par VANDER SCHLEY. Cet Ouvrage contient entre autres, l'Hiſtoire & la Théorie de la Terre— La Formation des Planetes— La Production des Couches ou Lits de Terre— Les Coquilles & les autres Productions de la Mer, qu'on trouve dans l'intérieur de la Terre— Les inégalités de la ſurface de la Terre— Les Fleuves, les Mers, & les Lacs— Le Flux & le Reflux,— Les inégalitez du fond de la Mer, & les Courans— Les Vents Réglez— Les Vents Irréguliers, les Ouragans, les Trompes & quelques autres Phênomènes, cauſez par l'Agitation de la Mer & de l'Air— Les Volcans & les Tremblemens de Terre— Les Iſles nouvelles, les Cavernes, les Fentes perpendiculaires— L'Effet des Pluyes, les Marécages, les Bois Soûterrains, les Eaux Soûterraines— Les changemens des Terres en Mers, & de Mers en Terres— L'Hiſtoire Naturelle des Animaux, & celle de l'Homme. *Les Tomes* IV. & V. de cet Ouvrage, qui ſont ſous Preſſe, contiendront des Pièces qui ne ſe trouvent pas dans l'Edition de Paris, & paroîtront inceſſamment. Quoiqu'on les exécute avec toute la propreté poſſible, on pourra pourtant les avoir à un tiers moins que l'Edition de Paris.

—— Le même Livre en Grand Papier.

Eſſai ſur l'Hiſtoire Naturelle des Corallines, & d'autres Productions Marines du même Genre, qu'on trouve communement ſur les Côtes de la Grande-Bretagne & d'Irlande; auquel on a joint une Deſcription d'un Grand Polype de Mer, pris auprès du Pole Arctique, par des Pêcheurs de Baleine, pendant l'Eté de 1753. par *Jean Ellis*, Membre de la Societé Royale. Traduit de l'Anglois. 1756. 4°.

—— Le même Livre en Grand Papier, dont les Eſtampes ſont très proprement & très exactement enluminées d'après Nature. 4to.

Eſſai ſur Hiſtoire Naturelle de la Mer Adriatique, traduite de l'Italien de Mr. *Donati*, Profeſſeur à Turin, avec des Figures, 4to. *Sous Preſſe.*

Hiſtoire Naturelle des Oiſeaux, par M. *E. Albin*, avec les Notes de *Derham*, à la Haye 1750. 3 vol, in 4to., ſur du Papier Royal, avec plus de 300. Eſtampes.

—— le même Ouvrage, peint en Mignature, avec les Couleurs du Plumage de chaque Oiſeau, tirées d'après Nature.

Hiſtoire Générale des Voyages, ou Nouvelle Collection de toutes les Rélations des Voyages par Mer & par Terre, qui ont été publiées juſques à préſent dans les différentes Langues de toutes les Nations connuës. *à la Haye* 1747. *ſuiv.* avec quantité de belles Cartes Géographiques, & d'Eſtampes, gravées par *J. vander Schley*, Elève diſtingué du célébre *Picart le Romain*. XIII. vol. 4to. NB. Cette Edition eſt infiniment plus ample, plus exacte & plus vraie que celle de Paris; & on ſe donne tous les ſoins poſſibles pour la rendre de plus en plus intéreſſante & magnifique.

Hiſtoire Générale de l'Auguſte Maiſon d'Autriche, contenant une Deſcription exacte de tous ſes Empereurs, Rois, Ducs, Archiducs, & autres Princes, tant Eccleſiaſtiques que Séculiers; l'Acquiſition de tous leurs Royaumes, Principautez, & Pays Héréditaires; leurs Guerres, Traitez de Paix, Alliances, & Mariages; avec tous les Portraits des Princes qui ſont parvenus à l'âge de Majorité. Brux. 1744. 3 vol. in fol.

Carte Topographique des Villes de Londres & de Weſtminſter, du Bourg de Soutwark, & de leurs Environs; levée très exactement ſur les Lieux, par *Jean Rocque*. Londres 1746. en XVI. grandes Feuilles.

Le Plan de Paris & de ſes Fauxbourgs, avec ſes Environs; où ſe trouve le détail des Villages, Châteaux, grands Chemins & autres; des Hauteurs, des Bois, Vignes, Champs, & Prez, levé par Mr. *Rouſſel*, Capitaine Ingénieur du Roi, & réduit ſur la même Echelle de celui de Londres, par *J. Rocque*. Lond. 1747. en VII. grandes Feuilles.

Le Vitruve Danois, contenant les Plans, les Elévations, & les Profils des principaux Bâtimens du Royaume de Dannemarc, auſſi bien que des Provinces Allemandes, dépendantes du Roi, avec une courte Deſcription de chaque Bâtiment en particulier; par Monſieur le Colonel de *Tburah*, Intendant des Bâtimens du Roi, &c. Coppenhague 1745—1749 2 vol. grand Fol., avec quantité de magnifiques Eſtampes.

Deſcription circonſtantiée de la Réſidence Royale & Capitale de Coppenhague, avec une Explication de toutes les Choſes dignes de remarque, que renferme de nos jours cette grande Ville; par Mr. le Colonel *Tburah*, à Coppenhague 1748. in 4to., avec CX. Eſtampes.

De

Digitized by Google

De l'Attaque & de la Défenſe des Places, par le Maréchal de *Vauban* à la Haye 1742. 2 vol. 4to. avec de belles Planches.

Hiſtoire des XVII. Provinces des Pays-Bas, depuis l'Abdication de l'Empereur *Charles V.* en 1555. juſqu'à la Paix de Baden, par Mr. *van Loon.* à la Haye 1736. 5 vol. avec plus de 1000 Medailles.

Hiſtoire de *Charles XII* Roi de Suède, par Mr *de Nordberg.* Haye 1748 4 vol. 4to. NB Comme on a débité tant de Contrevéritez ſur le chapitre de ce grand Prince, on a eu ſoin de munir cette Edition de plus de 200 Pièces Originales, qui, en detruiſant ce que certains Auteurs mal informés ont eu l'imprudence d'avancer dans leurs Ecrits, confirment en même temps les Faits les plus importants de cette Hiſtoire.

——— le même Livre en grand Papier.

Les Avantures de *Don Quichotte*, repréſentées en Figures, par *Coypel*, *Picart* le Romain, & autres habiles Maîtres, avec les Explications des XXXI. Planches de cette magnifique Collection, tirées de l'Original Eſpagnol de *Miguel de Cervantes*, A la Haye 1746. in 4to.

——— le même Livre. In Folio.

La Bibliothèque Univerſelle, Choiſie, Ancienne & Moderne, par le célébre Mr. *Le Clerc.* 83 vol. in 12°.

La Bibliothèque *Brittannique*, ou Hiſtoire des Ouvrages des Savans de la Grande-Bretagne, par une Société de Gens de Lettres à Londres. A la Haye 1734., & ſuiv. 50 parties. in 8vo.

Lettres, Mémoires & Négociations de Mr. le Comte d'*Eſtrades*, tant en qualité d'Ambaſſadeur de S. M. T. C. en Italie, en Angleterre, & en Hollande, que comme Ambaſſadeur Plénipotentiaire à la Paix de Nimègue, conjointement avec Mr. *Colbert*, & le Comte d'*Avaux*, avec les Réponſes du Roi & du Sécrétaire d'Etat; Ouvrage où ſont compris l'Achât de *Dunkerque*, & pluſieurs autres choſes intéreſſantes. Nouvelle Edition, dans laquelle on a rétabli tout ce qui avoit été ſupprimé dans les précédentes. Londres 1743. 9 vol. in 12o.

Mémoires du Comte de *Guiche*, concernant les Provinces-Unies des Pays-Bas, depuis 1665. juſqu'au 15. de Juin 1672. Ouvrage qui ſert de preuve & de confirmation aux Lettres & Negociations de Mr. le Comte d'*Eſtrades*, & aux Mémoires de Mr. d'*Aubery* A la Haye 1744. in 12°.

Hiſtoire du Syſtême des Finances, ſous la Minorité de *Louis XV.* avec un Abrégé de la Vie du Duc Régent, & de celle du Sr *Law* Haye 1734 6 vol. 12°.

Le Maſque de Fer, ou les Avantures ſurprenantes du Pére & du Fils. Haye 1747. 6 vol. 12°.

Médailles de Grand & de Moyen Bronze du Cabinet de la Reine *Chriſtine* de Suède, gravées auſſi délicatement qu'exactement d'après les Originaux, par *P. Santes Bartolo*, avec un Commentaire de M. *Havercamp*, Lat & Franc Haye 1741. fol.

——— Le même Livre, en grand Papier.

Une magnifique Mappemonde en une grande Feuille, d'une Compoſition d'autant plus curieuſe & nouvelle, que les Mappemondes ordinaires, repréſentant le Globe Terreſtre coupé en deux Parties, renfermées chacune dans un Cercle, tous les Méridiens & les Parallèles à l'Equateur y ſont auſſi marquez par des Lignes Courbes; au lieu que dans cette nouvelle Mappemonde, qui du Globe fait un Cylindre, les cercles de la Sphère y paroiſſent en Lignes droites, & degagent la Géographie de la gêne où elle a toûjours été dans ces ſortes de Cartes. On a fait entrer dans cette Carte ce que nous avons aujourd'hui de plus certain, & entièrement conforme aux Obſervations Aſtronomiques tant ſur la Ruſſie, la Siberie, la Tartarie, & la Chine, que ſur l'Amérique, qui, dans cette Carte, ſe trouve conſiderablement raprochée de l'Aſie. Les Changemens & les Augmentations, qui ſe trouvent dans les Parties ſeptentrionale & meridionale de l'Amérique ſont ſi conſiderables, qu'elle peut paſſer pour nouvellement découverte: par Mr. *Bellin.*

——— La même Carte en grand Papier.

——— La même ſur du Taffetas Blanc.

Remarques Hiſtoriques, Critiques, & Philoſophiques ſur le Nouv. Teſtam., par Mr. *Beauſobre* le Pére. Haye 1742. 2 vol. 4to.

Thréſor des Antiquitez de la Couronne de France, répreſentées en Figures d'après les Originaux, en Pierre, en Or, en Argent, en Cuivre, en Peinture, Sculpture, Gravure, &c. Haye 1745. 2 vol. fol. avec plus de 300 Eſtampes.

——— Le même Livre, en grand Papier.

Hiſtoire de la Peinture & de la Sculpture, par Mr. *Richardſon* Pére & Fils. Amſt. 1728. 3 vol. 8vo.

La Vie d'*Elizabeth*, Reine d'Angleterre, nouvelle Edition, augmentée du véritable Caractère d'*Elizabeth* & de ſes Favoris. Haye 1741. 2 vol. 12°.

Le Grand Théatre Sacré du Duché de Braband, contenant la Deſcription de l'Egliſe Métropolitaine de Malines, & de toutes les autres Egliſes Cathédrales, Colléglales, & Paroiſſiales; des Abbayes, Prévôtez, Prieurez, & Couvens d'Hommes, & de Femmes; les Vies des Evêques; la ſuite des Prévôts, Doyens, Archi-Diacres, Abbez, Abbeſſes, Prieurs, & Prieures; les Tombes, Cabinets d'Armes, Epitaphes, Inſcriptions, &c. à la Haye 1736. 4 vol. avec quantité d'Eſtampes.

Diſcours Hiſtoriques, Critiques, Théologiques & Moraux, ſur les Evénemens les plus mémorables de l'Ancien & du Nouveau Teſtament, par Mrs. *Saurin*, *Roques* & *Beauſobre*; avec les belles Eſtampes de Mr. *Hoet*, *Houbraken*, & *Picart*. *à la Haye*, *6 vol. in folio*, *ſur du Papier Median.*

——— *ſur du Papier Royal.*

——— *ſur du Papier Superroyal.*

——— Les Volumes ſeparés de cet Ouvrage, ſur du Papier Imperial, Superroyal, Royal & Median.

Recueil d'Eſtampes qui répreſentent les Evénemens les plus Mémorables de l'Ancien & du Nouveau Teſtament, par Mr. *Hoet*, *Houbraken*, & *Picart*, *ſur du Papier Royal.*

Hiſtoire

Hiſtoire d'Angleterre, par Mr. de *Rapin Thoiras*. 10 vol. 4to.

——— de Lorraine, par le R. P. *Don Calmet*, Nouvelle Edition conſidérablement augmentée, 5 vol. avec des Figures. folio.

Atlas de la Hollande Ancienne, & de ſa véritable ſituation, telle qu'elle étoit ſous la Domioation des anciens Empereurs, Rois, Ducs & Comtes, repréſentée en IX. Cartes Géographiques. à la Haye 1745. fol.

L'Avocat du Diable, ou Mémoires Hiſtoriques & Critiques ſur la Vie & la Légende du Pape Gregoire VII. 1743 3 vol. 12°.

Chronique des Rois d'Angleterre, écrite dans le Style des Anciens Hiſtoriens Juifs, par *Nathan Ben Saddi*. Prêtre de cette Nation. Londr. 1743. 8vo.

Las Diſſertationes Eccleſiaſticas de el Marquez de Agropoli y Mondexar. Lisboa 1747. 2 vol. fol.

Délices de la Grande-Bretagne; ſes Antiquitez, Provinces, Villes, Bourgs, Montagnes, Rivières, Ports de Mer, Bains, Forteresſes, Abbayes, Egliſes, Academies, Colléges, Bibliothèques, Palais, Maiſons de Campagne, par J. *Beeverel*. Leiden 1727. 8 vol. 8vo.

Examen du Pyrrhoniſme Ancien & Moderne, par Mr. de *Crouſaz*: ou Refutation du Pyrrhoniſme, qui régne dans le Dictionaire & dans les Ocuvres de Bayle, à la Haye 1734. fol. grand Papier.

La Guerre Séraphique, ou Hiſtoire des Périls qu'a courus la Barbe des Capucins par les violentes Attaques des Cordeliers: avec un Diſcours ſur l'Inſcription qui ſe trouve au Portail de l'Egliſe de Rheims *Deo Homini & Beato Francisco utrique Crucifixo*. Haye 1739. 12°.

Hiſtoire de la Papeſſe Jeanne, par Mr. *Spanheim*. à la Haye 1736. 2 vol. fig. 8vo.

Lettres Critiques & Philoſophiques, par Mademoiſelle *Cochois*, avec les réponſes du Marq. d'*Argens*. à la Haye 1743. 12°.

Mémoires pour ſervir à l'Hiſtoire de l'Eſprit & du Cœur, par le Marq. d'*Argens*, & par Mademoiſelle *Cochois*. à la Haye 1744. 8vo.

Métallurgie, ou l'Art de tirer & de purifier les Métaux, avec les Diſſertations les plus rares ſur les Mines & les Opérations Métalliques. à la Haye 1751. 2 vol. 12°.

Traité de la Peinture & de la Sculpture par Mr. *Richardſon* Pére & Fils. Amſt. 1728. 3 vol. 8vo.

Hiſtoire des Triumvirats, depuis la Mort de Catilina, juſque celle de Céſar; depuis celle de Céſar, juſqu'à celle de Brutus; depuis celle de Brutus, juſqu'à celle d'Antoine, par *Larrey*. à la Haye 1746. 4 vol. 12°.

Hiſtoire de la Vie & des Ouvrages de François Bacon avec les Portraits de Fr. Bacon, & de Rob. Walpole, à la Haye 1735.

Pharſamoo, ou les Nouvelles Folies Romanesques, par Mr. de Marivaux, a la Haye 1736. 2 vol.

Payſan Gentilhomme, ou, les Avantures de Mr. Ranſau, & ſon Voyage aux Iſles Jumelles. a la Haye 1735.

Roderic & Mitra, ou le Demon & la Demonne mariés, Nouvelle Hiſtorique, Hebraïque & Morale. a Demonopolis 1745. 2 vol. 12vo.

Le Sens Literal de l'Ecriture Sainte defendu contre les principales Objections des Antiſcripturalres & des Incredules Modernes par Stakhouſe: avec une Diſſertation ſur les Demoniaques. Haye 1741 3 vol

Conſolation Philoſophique de Boece: nouvelle Traduction, avec la Vie de l'Auteur, des Remarques Hiſtoriques & Critiques; & une Dedicace Maçonnique, par un Frere Maçon, Membre de l'Academie Royale des Sciences de Berlin. a la Haye 1744. 2 vol. 8vo.

Replique des Commiſſaires Anglois au Memoire des Commiſſiaires François, concernant la Nouvelle Ecoſſe, ou, l'Acadie: avec une Carte enluminée de la Nouvelle Ecoſſe, & du Cap Breton, de même que des Parties adjacentes de la Nouvelle Angleterre & du Canada, a la Haye 1756. 8vo.

——— La Carte du Sufdit Ouvrage ſe vend auſſi Separement.

La Conduite des François par raport à la Nouvelle-Ecoſſe; depuis le premier Etabliſſement de cette Colonie, juſques à nos jours: Ouvrage où l'on expoſe la foibleſſe des Argumens dont ils ſe ſervent pour éluder la force du Traité d'Utrecht, & pour juſtifier leurs Procédez illegitimes. 8vo.

Réponſe à la Lettre Inſerée dans la Gazette d'Utrecht du 8 Sept. 1755. avec des Remarques ſur la Diſcuſſion ſommaire ſur les Anciennes Limites de l'Acadie. 8vo.

Lettre du Duc de Newcaſtle, écrite par ordre de Sa Majeſté, à Mr. *Michell*, Sécretaire d'Ambaſſade de S. M Pruſſienne, en Réponſe à l'Expoſition des Motifs du Rol de Pruſſe, & au Mémoire & autres Papiers remis par ledit Sr. *Michell* au Duc de Newcaſtle au ſujet des Saiſies faites en Sileſie. 8vo.

Joſ. Em. Minlanæ de Bello Ruſtico Valentino, libri tres, ſive, Hiſtoria de Ingreſſu Auſtriacorum Foederatorumque in Regnum Valentiæ: ex Bibliotheca Georgii Maianſii. *Hagæ Comitum* 1752 8vo.

L. Sectani, Q Filii, de tota Græculorum hujus Ætatis Litteratura, Sermones quatuor; acceſſere ad eorum Defenſionem Quintus & Sextus. *Hagæ Com.* 1752. 8vo.

Gulli. Ferrarii de Rebus Geſtis Eugenii, Principis a Sabaudia, Bello Pannonico, Libri III. *Hagæ Com.* 1749. 8vo.

Joh. Chriſtop. Struchtmeyeri, Theologia Mythica, ſive, de Orgioe Tartari & Elyſii libri quinque: quibus oſtenditur, Fabulas Gentilium de Diis, eorundemque Ritus Sacros, unice deduci & explicari debere ex Religione Primi Orbis, Myſteriiſque Sacro Sanctis de Deo uno & trino, Chriſto, Spiritu Sancto. & Regno Dei inter homines. *Hagæ Com.* 1753. 8vo.

FIN.

Digitized by Google

Digitized by Google